

← مشخصات دارو:

قرص های آکاربوز آریا خط دار و به رنگ سفید ۵۰ یا ۱۰۰ میلی گرم می باشند.

← موارد مصرف دارو:

آکاربوز به عنوان یک درمان کننده کمکی به همراه رژیم غذایی برای درمان دیابت نوع ۲، در حالی که گلوکز خون به تنهایی توسط رژیم غذایی کنترل نمی شوند، استفاده می شود. آکاربوز ممکن است به تنهایی یا همراه با یک سولفونیل اوره استفاده شود.

Ref.: USP DI 2007, Page 13

← مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف آکاربوز در حین بارداری و شیردهی به دلیل فقدان تحقیقات کافی و مشخص توصیه نمی شود.

Ref.: USP DI 2007, Page 13

← تداخلات دارویی:

– امکان کاهش اثر آکاربوز با آنزیم های گوارشی مثل آمیلاز و پانکراتین.
– امکان بروز کاهش یا افزایش قند خون در مصرف هم زمان با بلوک کننده های کانال کلسیم، کورتیکواستروئیدها، تیازیدها، استروژن ها، ضدبارداری های هورمونی، ایزونیازید، نیاسین، فنوتیازین ها، فنی توئین، عوامل سمپاتومیمتیک، هورمون های تیروئیدی.

Ref.: USP DI 2007, Page 13

← عوارض جانبی:

– عوارضی که در صورت بروز نیاز به توجه هر چه سریعتر پزشکی دارند: زردی چشم و پوست.
– عوارضی که در صورت تداوم و ایجاد مزاحمت نیاز به توجه پزشکی دارند: دردهای شکمی، اسهال، نفخ.

Ref.: USP DI 2007, Page 14

← قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– چنانچه نسبت به این دارو حساسیت دارید.
– چنانچه در دوران بارداری و شیردهی به سر می برید.
– چنانچه سابقه کتواسیدوزیس دیابتی، بیماری کبدی، اختلالات روده ای یا نارسایی کلیوی دارید.

Ref.: USP DI 2007, Page 14

← احتیاطات:

- در صورت مصرف دخانیات، الکل یا داروهای دیگر و یا مسافرت حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

- علائم کاهش قند خون شامل اضطراب، تغییرات رفتاری مشابه مستی، دوبینی، عرق سرد، گیجی، پوست سرد و رنگ پریده، به سختی متمرکز شدن، خواب آلودگی، گرسنگی زیاد، ضربان قلب سریع، سر درد، تهوع، عصبانیت، کابوس، خواب آشفته، سستی، اختلال در تکلم، خستگی و ضعف غیرمعمول را تشخیص دهید و با پزشک خود مشورت کنید.

- علائم افزایش قند خون شامل تاری دید، خواب آلودگی، خشکی دهان، قرمزی و خشکی پوست، افزایش ادرار، کاهش اشتها، معده درد، تهوع یا استفراغ، خستگی، تنفس سریع و عمیق، بیهوشی یا تشنگی غیر معمول را تشخیص دهید و با پزشک خود مشورت کنید.

Ref.: USP DI 2007, Page 14 & 15

← مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک معالج شما تعیین می‌گردد و تبعیت از دستور پزشک معالج در مورد مقدار و نحوه مصرف آن الزامی است.

دوز ابتدایی دارو ۲۵ میلی‌گرم سه‌بار در روز قبل از وعده غذایی می‌باشد.

بسته به پاسخ بیمار دوز دارو به صورت برنامه‌ریزی شده و تدریجی در افراد با وزن ۶۰ کیلوگرم یا کمتر از ۶۰ کیلوگرم تا ۵۰ میلی‌گرم سه بار در روز و در افراد با وزن بیشتر از ۶۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ میلی‌گرم سه‌بار در روز می‌تواند افزایش یابد.

در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو و یا به یاد آوردن آن پس از اتمام غذا، از مصرف آن نوبت از دارو صرفه نظر کرده و دوز بعدی را با وعده غذایی بعدی میل نمایید. مقدار دارو را دو برابر نکنید.

Ref.: USP DI 2007, Page 14 & 15

← شرایط و نحوه نگهداری:

- از دسترس اطفال دور نگهدارید.

- دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

Ref.: USP DI 2007, Page 15

