

استامینوفن آریا

استامینوفن ۳۲۵ و ۵۰۰ میلی‌گرم

Acetaminophen Arya

Acetaminophen 325, 500 mg

مشخصات دارو:

قرص استامینوفن آریا ۳۲۵ و ۵۰۰ قرص‌های سفید رنگ می‌باشند که به ترتیب حاوی ۳۲۵ و ۵۰۰ میلی‌گرم استامینوفن است. قرص استامینوفن آریا ۳۲۵ در دو بسته‌بندی ۳۰ عددی و ۱۰۰ عددی که به ترتیب حاوی ۳ بلیستر ۱۰ عددی و ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی می‌باشند عرضه می‌گردد. قرص استامینوفن آریا ۵۰۰ در جعبه‌های ۱۰۰ عددی که حاوی ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی می‌باشند عرضه می‌شود.

موارد مصرف دارو:

استامینوفن (Acetaminophen) یا پاراستامول (Paracetamol)، دارویی مسکن و تب بر است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. استامینوفن به خوبی قابل تحمل بوده و مانند آسپرین عوارض جانبی زیادی ندارد و معمولاً برای درمان تب، سردرد، دردهای خفیف، کمردرد، دردهای قاعدگی، دردهای عضلانی و دندان درد استفاده می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از توصیه آن به دیگران و از مصرف آن در موارد مشابه و مصرف بیش از حد جداً خودداری فرمایید.
- در صورتی که بیماری‌های کلیوی، کبدی و فنیل‌کتونوری دارید با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
- در صورت حساسیت به استامینوفن و یا اجزای تشکیل دهنده دارو با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری:

هر چند این دارو در گروه B مطابق تقسیم‌بندی FDA قرار دارد ولی بهتر است قبل از مصرف دارو با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران شیردهی:

استامینوفن در شیر مادر ترشح می‌شود هر چند از بروز عوارض جانبی در نوزادان شیرخوار به جز ۱ مورد ایجاد ریش در یک نوزاد شیرخوار گزارش دیگری ثبت نشده است ولی توصیه می‌شود قبل از مصرف دارو با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

هشدارها:

- قرص استامینوفن ۵۰۰ نباید در کودکان زیر ۱۲ سال مصرف شود.
- قرص استامینوفن ۳۲۵ میلی‌گرم در کودکان زیر ۳ سال با مشورت پزشک مصرف شود.
- از مصرف این دارو همراه با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری نمایید.

موارد منع مصرف و احتیاطات:

- این دارو ممکن است باعث آسیب کبدی شود.
- اگر گلودرد شدید به مدت بیش از ۲ روز همراه با تب، سردرد، تهوع، بثورات جلدی و یا استفراغ مشاهده شد در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.
- در صورتی که پس از مصرف این دارو، درد پس از گذشت ۱۰ روز در بزرگسالان و ۵ روز در کودکان و تب پس از گذشت ۳ روز بهبود نیافت و یا بدتر شد و علائم جدیدی هم مشاهده گردید، مصرف دارو را متوقف کرده و با پزشک خود تماس بگیرید.
- از مصرف نوشابه‌های الکلی پرهیز نمایید زیرا باعث افزایش عوارض جانبی پاراستامول می‌شود.
- اختلال عملکرد کبدی: بیمارانی که دچار آسیب کبدی هستند با احتیاط مصرف نمایند زیرا این دارو باعث افزایش خفیف آنزیم‌های کبدی می‌شود.

تداخلات دارویی:

- در صورت مصرف هم‌زمان هر داروی دیگری از جمله داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی خصوصاً آسپرین و یا

سایر داروها با پزشک خود مشورت نمایید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

مقدار مصرف دارو در بزرگسالان و کودکان با سن بیشتر از ۱۲ سال:

- ۳۲۵ تا ۶۵۰ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت.
- مقدار حداکثر مجاز مصرف دارو ۴ گرم در ۲۴ ساعت می باشد.

مقدار مصرف دارو در کودکان ۲ تا ۱۲ سال:

- ۱۰ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.

چنانچه یک نوبت مصرف این دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری آن را میل نمایید در صورتی که نزدیک نوبت مصرف بعدی دارو بود دوز فراموش شده را حذف کنید و دوزهای بعدی را نیز دوبرابر ننمایید.

عوارض جانبی:

همراه با اثرات درمانی با مصرف این دارو ممکن است عوارض ناخواسته ای بروز نماید اگرچه همیشه و یا همه عوارض گفته شده ممکن است در یک فرد ظاهر نشود. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید.

- زردی چشم یا پوست، تیره شدن و یا وجود خون در مدفوع، درد ناحیه کمر، بثورات جلدی، خارش، ظاهر شدن لکه های سفید یا زخم بر روی لب و دهان، گلودرد، خستگی مفرط، سرگیجه و هیجان.
- عوارض خونی زیر نیز مشاهده شده است:
- نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی / گزارش هایی بسیار نادر از کم خونی همولیتیک و متهموگلوبینمی.
- همچنین مواردی از افزایش خفیف آنزیم های کبدی / آسیب به کلیه ها و بروز خونریزی غیر معمول و تهوع و استفراغ، مشاهده شده است.

مصرف پیش از مقدار توصیه شده دارو و مسمومیت:

- در بزرگسالان مصرف بیش از ۷/۵ گرم استامینوفن در ۲۴ ساعت منجر به مسمومیت می شود. مصرف دوزهای درمانی بالاتر از حد معمول نیز در طولانی مدت می تواند ایجاد مسمومیت نماید.
- آسیب کبدی و با درصد وقوع کمتر آسیب کلیوی از عوارض مصرف بیش از مقدار توصیه شده استامینوفن می باشند.
- علائم اولیه مسمومیت تهوع و استفراغ است که معمولاً در ۲۴ ساعت اول بروز می کند و پس از این زمان همراه با احساس درد و حساس شدن در ناحیه زیر دنده راست می باشد.
- در صورت بروز علائم فوق و یا مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

Ref: BNF70 - September 2015 - March 2016, Page 354-356

Drug Facts and Comparisons 2010, Vol1, Page 1222-1224

USP DI 2007, Vol1, page 15-21



www.aryapharm.com

info@aryapharm.com

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی برگه راهنما: ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۰

تولید شده در شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص)

ایران - تهران ۳ - ۹۸ ۹۸ ۱۰ ۸۱ - ۴۴