

قرصی آملودیپین ۵ میلی‌گرم

آملودیپین یک داروی بلوک کننده کانال کلسیم می باشد که در درمان آنژین صدری و فشار خون بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

یادآوری :

- این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است ، از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دارو را کاملاً مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید ، حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید مصرف دارو را قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو نیز پرهیز نمایید.
- داروها را به طور کلی دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

- چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

الف - راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید:

- چنانچه نسبت به انواع غذاها و افزودنی های آنها مانند رنگ ها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.

- چنانچه سابقه بیماری کبدی ، نارسایی احتقانی قلب و پایین بودن فشار خون دارید.

- چنانچه داروهای دیگری مصرف می نمایید.

- چنانچه حامله هستید یا ممکن است حامله شوید و یا در دوران شیردهی به سر می برید.

ب - مصرف در بارداری و شیردهی :

- در دوران بارداری مطالعات خاصی بر روی انسان انجام نشده است و منافع مصرف دارو بایستی در برابر مضرات آن سنجیده شود.

- در صورت ضرورت مصرف دارو در دوران شیردهی می بایستی روش جایگزینی در تغذیه نوزاد به کار رود.

پ - احتیاطات :

- جهت انجام معاینات دوره ای به طور منظم به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.

- در صورتی که این دارو را به مدت چند هفته به صورت متوالی مصرف نموده اید به طور ناگهانی مصرف آن را قطع نکنید ، جهت قطع نمودن تدریجی مصرف دارو به پزشک خود مراجعه کنید.

- از فعالیت بدنی بیش از حد معمول پرهیز نموده و در مورد حد مجاز فعالیت بدنی خود با پزشک مشورت نمایید.

- مصرف این دارو ممکن است موجب بروز سر درد شود که با تداوم مصرف دارو از بین می رود . در صورت ادامه یا شدت یافتن سر درد با پزشک خود مشورت نمایید.

- مراقبت بیشتری از سلامتی دندان ها و لثه های خود به عمل آورده و جهت اطمینان از سلامتی آن ها هر چند وقت یکبار به دندانپزشک مراجعه نمایید.

- از خوردن غذاهای پر نمک پرهیز نمایید و مراقب افزایش وزن خود باشید.

- از مصرف هر نوع داروی دیگر بدون مشورت با پزشک خود پرهیز نمایید. خصوصاً از مصرف

داروهایی که آنها را بدون نسخه تهیه می نمایند نظیر سرماخوردگی ، سرفه ، آسم ، کاهنده اشتها ، مشکلات سینوسی و تب یونجه بدون مشورت با پزشک پرهیز کنید.

• در صورت استفاده از داروهای بی حسی یا بیهوشی ، ضد التهاب ها مخصوصاً ایندومتاسین ، داروهای قلبی، نیفدیپین ، دیورتیک ها ، املاح پتاسیم ، استروژن ، ضد انعقادها ، کومارین ، ضد تشنج ها ، هیدانتوئین ، کینین ، سالیسیلات ها ، سولفین پیرازون ، لیتیوم قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.

ت - مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک شما تعیین می گردد ، اطلاعاتی که ذیلاً ارائه می گردد تنها بیانگر دوز درمانی تجویز شده می باشد ، تبعیت از دستورات پزشک در مورد مقدار و نحوه مصرف این دارو الزامی است.

به عنوان ضد آنژین (درد قفسه سینه) :

بزرگسالان : ۵ الی ۱۰ میلی گرم یک بار در روز

به عنوان پایین آورنده فشار خون :

بزرگسالان ۲/۵ الی ۱۰ میلی گرم یک بار در روز

سلامتی و بی ضرری این دارو در اطفال ثابت نشده است.

چنانچه یک نوبت مصرف این دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری آن را میل نمایید .

در صورتی که نزدیک به نوبت مصرف بعدی دارو بوده دوز فراموش شده را میل نکنید و دوزهای بعدی را نیز دو برابر نسازید.

ث - عوارض جانبی

همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی عوارض ناخواسته ای بروز می نماید. اگرچه این عوارض ممکن است در یک فرد ظاهر نشود لیکن در صورت بروز عوارض زیر پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید.

ورم پاها یا زانو ، سرگیجه ، ضربان کوبنده قلب ، درد قفسه سینه ، سرگیجه یا سبکی سر هنگام برخاستن یا نشستن ، کند شدن ضربان قلب.

در صورت ادامه یافتن عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید.

گر گرفتن ، سر درد ، تهوع ، خستگی یا ضعف غیر عادی.

ج - مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد لازم فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

چ - شرایط و نحوه نگهداری :

• از دسترس اطفال دور نگهدارید.

• دارو را دور از نور مستقیم و حرارت نگهداری نمایید.

• در حمام، نزدیک ظرفشویی آشپزخانه و یا سایر نقاط مرطوب قرار ندهید.

• داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.

• از نگهداری دارو در یخچال یا فریزر خودداری کنید.

