

قرص آتورواستاتین ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم

آتورواستاتین از دسته مهارکننده های آنزیم ۳- هیدروکسی -۳- متیل گلووتاریل کو آنزیم A ردوکتاز می باشد. از آنجا که این آنزیم برای سنتز کلسترول ضروری است مهار آن سبب کاهش میزان کلسترول خون می شود. آتورواستاتین از طریق کاهش کلسترول LDL، آپولیپوپروتئین B و تری گلیسیریدها و افزایش کلسترول HDL از عوارض ناشی از انسداد عروق خونی ممانعت می کند.

یادآوری :

این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است از مصرف آن در موارد مشابه یا از توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

دارو را کاملاً مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید. حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید، مصرف دارو را قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو پرهیز نمایید.

داروها را به طور کلی دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

راهنمایی های عمومی :

این دارو به عنوان درمان کمکی مصرف می شود و تنها در صورت رعایت رژیم غذایی و انجام تمرینات ورزشی موثر می باشد.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید :

- چنانچه نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مهارکننده آنزیم هیدروکسی متیل گلووتاریل کوآنزیم A ردوکتاز، انواع غذاها و افزودنی های آن ها مانند رنگ ها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.

- چنانچه سابقه سوء مصرف الکل، بیماری کبدی یا کلیوی، حملات تشنجی (صرع) کنترل نشده، پیوند عضو و درمان برای جلوگیری از رد آن داشته یا اخیراً تحت عمل جراحی وسیع قرار گرفته اید.

- چنانچه حامله هستید یا ممکن است حامله شوید و یا در دوران شیردهی به سر می برید.

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع می باشد.

احتیاطات :

این دارو را فقط طبق دستور پزشک و دقیقاً مطابق مقدار و مدت زمان توصیه شده مصرف نمایید. جهت انجام معاینات دوره ای به طور منظم به پزشک معالج خود مراجعه نمایید. در صورت مصرف این دارو عملکرد کبدی باید قبل از آغاز دوره درمان و به مدت یک سال بعد از آخرین افزایش دوز دارو بررسی شود.

هنگام مصرف این دارو رژیم غذایی توصیه شده توسط پزشک معالج خود را دقیقاً مراعات نمایید.

مصرف این دارو را بدون مشورت با پزشک خود قطع نکنید زیرا قطع مصرف این دارو ممکن است باعث افزایش کلسترول خون شود. پزشک شما رژیم غذایی خاصی را برای جلوگیری از بروز این حالت پیشنهاد خواهد کرد.

قبل از انجام هر نوع عمل جراحی (شامل جراحی دندان) یا جراحی های اورژانس پزشک یا دندانپزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.

در صورت استفاده از داروهای دیگوکسین، سیکلوسپورین، ایتراکونازول، کتوکونازول، اریترومايسين، کلاریترومایسین، مهارکننده های HIV پروتاز، نفازودون، جم فیروزیل، نیاسین، کنتراستپتوهای خوراکی و سایر داروها با پزشک خود مشورت نمایید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک معالج شما تعیین می گردد و تبعیت از دستور پزشک معالج در مورد مقدار و نحوه مصرف آن الزامی است. اطلاعاتی که ذیلا آرایه می گردد حدود دوز درمانی دارو را بیان می دارد.

مقدار مصرف آتورواستاتین روزانه ۱۰ الی ۸۰ میلی گرم به صورت تک دوز می باشد. دوز ابتدایی این دارو روزانه ۱۰ میلی گرم، قابل افزایش تا ۸۰ میلی گرم در طی ۴ هفته می باشد. چنانچه یک نوبت مصرف این دارو را فراموش نمودید به محض یاد آوردن آن را میل نمایید در صورتی که نزدیک مصرف نوبت بعدی دارو بود دوز فراموش شده را میل نکنید و دوزهای بعدی را نیز دو برابر نسازید.

عوارض جانبی :

عوارض جانبی گزارش شده با این دارو شامل اختلالات گوارشی، هیاتیت، پانکراتیت، سندرم افزایش حساسیت، آنژیوادم، میوپاتی، میالژیا، ضعف عضلانی و افزایش غلظت کراتین فسفوکیناز می باشد.

در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید :

تب، درد یا گرفتگی عضلانی، درد شدید معده، خستگی یا ضعف غیرعادی.

در صورت تداوم یافتن عوارض زیر پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید :

یبوست، اسهال، سر درد، نفخ و سوزش معده، تهوع، راش های پوستی، درد معده، فراموشی، بی خوابی، کاهش توانایی جنسی، تاری دید.

در صورت بروز هر نوع عارضه دیگر غیر از عوارض ذکر شده پزشک معالج خود را در جریان قرار دهید.

شرایط نگهداری :

- از دسترسی اطفال دور نگهدارید.

- دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- در حمام، نزدیک ظرفشویی و یا سایر نقاط مرطوب قرار ندهید.

- داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.

- از نگهداری دارو در یخچال یا فریزر خودداری کنید.

