

سلکوکسیب آریا

کپسول سلکوکسیب ۱۰۰ میلی گرم

سلکوکسیب از دسته داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی می باشد که به طور اختصاصی آنزیم سیکلواکسیزناز ۲ را مهار می کند. این دارو عموماً برای درمان آرتربیت روماتوئید و استئوآرتربیت به کار می رود.

یادآوری:

این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
دارو را کاملاً مطابق دستور پزشک مصرف نموده و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو پرهیز نمایید.

داروها را به طور کلی دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک معالج خود رسانده و با او مشورت نمایید:
- چنانچه نسبت به این دارو، سولفونامیدها و یا سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی حساسیت دارید.

- چنانچه سابقه زخم و یا خونریزی گوارشی دارید (خصوصاً در مورد مصرف همزمان کورتیکواستروئیدها، ضد انعقادها، ضد التهاب های غیر استروئیدی، سیگار و یا نوشابه های الکلی)
- چنانچه سابقه آسم، رینیت، اسپاسم برونش پس از مصرف آسپرین و یا سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی دارید.

- چنانچه سابقه بیماری شدید کبدی یا کلیوی دارید.
- چنانچه حامله هستید و یا ممکن است حامله شوید و یا در دوران شیردهی به سر می بردید.

موارد منع مصرف:

قبلاً نسبت به این دارو و یا سایر داروهای کم کننده ترشح اسید معده حساسیت داشته اید.

صرف در بارداری و شیردهی:

صرف این دارو در دوران بارداری و یا شیردهی مجاز نمی باشد، در صورت ضرورت مصرف دارو در دوران شیردهی باید روش جایگزین در تغذیه نوزاد به کار رود.

احیاطات:

جهت انجام معاینات دوره ای به طور منظم به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
این دارو را فقط طبق دستور پزشک و دقیقاً مطابق مقدار و مدت زمان توصیه شده مصرف نمایید.
در صورتی که این دارو را با دوزهای بالاتر از ۴۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز مصرف می نمایید، بهتر

است همراه غذا میل شود.

در صورت مصرف هم زمان این دارو و داروهای مهارکننده کربنیک انھیدراز، فوروزمايد، آسپرین، فلوكونازول، لیتیم، وارفارین و متاتروکسات با پیشک خود مشورت نمایيد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پیشک معالج شما تعیین می گردد و تبعیت از دستورات پیشک در مورد مقدار و نحوه مصرف این دارو الزامی است.

اطلاعاتی که ذیلاً ارائه می گردد حدود دوز درمانی این دارو را بیان می دارد:

درمان استوارتریت: ۲۰۰ میلی گرم یک بار در روز و یا ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز.
درمان آرتیتووماتوئید: ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلی گرم دو بار در روز.

عارض جانبی:

همراه با اثرات درمانی یک دارو کاهی عوارض ناخواسته ای بروز می نماید.
اگرچه این عوارض ممکن است در یک فرد ظاهر نشود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پیشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید:

واکنش های آلرژیک مانند راش های پوستی، تورم صورت، خس خس سینه، تنگی نفس، یرقان، تاول زدن و یا پوسته شدن پوست، مدفوع سیاه یا خونی، حرکات روده، استفراغ خون، درد شدید معده.

← در صورت تداوم یافتن عوارض زیر پیشک خود را در جریان قرار دهید:

● عوارض شایع تر: درد معده، اسهال، سوء هاضمه، گیجی، بی خوابی، گرفتگی بینی، ورم سینوس ها، گلو درد، عفونت ریه، ادم، ورم پاها و مقاصل، راش های پوستی.

● عوارض کمتر شایع: اضطراب، افسردگی، خستگی، تاری دید، وز وز گوش، کم خونی، غیر طبیعی شدن تست های کبدی و کلیوی، افزایش فشار خون، تپش قلب، سرفه، تورم دهان، نفخ، استفراغ، گاستریت، یبوست، عوارض پوستی مانند کهیر، احساس گز گز و خارش، گرفتگی عضلانی، کرامپ پاها، عفونت ادراری.

● عوارض نادر: واکنش های پوستی نظیر خون مردگی، افزایش حساسیت به نور، تورم، تاول و پوسته شدن، کاهش تعداد پلاکت ها و سلول های خونی، زخم و خونریزی دستگاه گوارشی، التهاب مری، تهوع، اختلال در بلع و قوه چشایی، احساس لرز، ریزش مو، هپاتیت، نارسایی کلیوی، درد عضلانی و مقاصل، التهاب عروق خونی، نارسایی قلبی، حمله قلبی، سر درد و احساس گیجی.

شرایط نگهداری:

- دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایيد.

- داروهای تاریخ گذشته را درو بریزید.

- از دسترس اطفال دور نگهدارید.

Ref: USP DI 2007

www.aryapharm.com
info@aryapharm.com

تولید شده در شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص)

ایران - تهران ۳ - ۱۰۸۱ - ۹۴۹۸

