

سیپروفلوکسازین

Ciprofloxacin

قرص و لشکار سیپروفلوکسازین ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرمی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

الف - راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

۱- چنانچه قبل از نسبت به این دارو و یا سایر مواد مانند غذاها و یا افزودنی های غذایی مانند رنگها و غیره حساسیت دارید.

۲- چنانچه داروی دیگری مصرف می کنید.

۳- در صورتیکه بیماری فعلی کلیوی، کبدی یا مغزی دارید، یا در طول درمان با این دارو دچار بیماری دیگری شدید.

ب - مصرف در بارداری و شیردهی :

صرف قرص های سیپروفلوکسازین در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

پ - احتیاطات :

در صورت عدم بهبود در مدت چند روز و یا تشدید علائم بیماری به پزشک خود مراجعه نمایید.

چنانچه آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم، منیزیم یا سوکرافیت مصرف می کنید، این دارو را حداقل ۲ ساعت بعد از مصرف قرص های سیپروفلوکسازین میل نمایید.

بعضی افراد ممکن است در دوران درمان با سیپروفلوکسازین نسبت به نور خورشید حساسیت بیشتری در مقایسه با موقع عادی پیدا کنند، بنابراین در این دوران لازم است در معرض تابش نور خورشید قرار نگیرند و تا حد امکان با پوشش مناسب قسمت های مختلف بدن خود را از تابش مستقیم نور آفتاب دور نگهدارند. در صورت بروز عوارض شدید آفتاب زدگی به پزشک خود مراجعه نمایید.

ت - مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو را پزشک بر حسب شدت بیماری و شرایط جسمی شما تعیین می کند.

قرص های سیپروفلوکسازین را با یک لیوان آب در حالیکه معده خالی است

میل نمایید . دوره درمان را کامل کنید . مصرف چندین لیوان آب در روز در دوره درمان با این دارو توصیه می شود .

چنانچه یک نوبت خوردن این دارو را فراموش کردید هرچه زودتر آن را میل نمایید ولی چنانچه زمان بیاد آوردن نزدیک نوبت بعدی دارو می باشد از مصرف قرص فراموش شده خودداری کرده و نوبت بعدی را طبق دستور پزشک مصرف نمایید و مقدار مصرف را دو برابر نکنید .

ث - عوارض جانبی :

همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی ممکن است عوارض ناخواسته ای نیز بروز نماید . اگرچه همیشه و همه عوارض گفته شده ممکن است در یک فرد ظاهر نشود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای به پزشک خود مراجعه نمایید .

در صورت بروز آشفتگی ، پریشانی ، تب ، توهمن ، رعشه ، قرمزی ، تحریکات پوستی ، خارش و ورم صورت و گردن فوراً به پزشک خود مراجعه کنید . عوارض دیگری مانند احساس ناراحتی و درد در ناحیه شکم ، اسهال ، گیجی ، خواب آلودگی ، سر درد ، احساس سبکی در سر ، تهوع ، استفراغ و بدخوابی نیز ممکن است بروز نماید که معمولاً با تطابق وضعیت بدن با دارو در طول درمان برطرف می شود . چنانچه این عوارض برطرف نشد و یا تحمل ناپذیر بود به پزشک خود مراجعه نمایید .

ج - مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده فوراً با پزشک خود تماس بگیرید .

چ - شرایط نگهداری :

این دارو را دور از رطوبت ، نور و حرارت نگهداری کنید و از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید .

