

قرص سیتالوپرام آریا ۴۰ میلی گرمی

سیتالوپرام یک مهار کننده اختصاصی باز جذب سروتونین (5-HT) میباشد که در درمان افسردگی و اختلالات پانیک مورد استفاده قرار میگیرد.

یادآوری:

این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید، مصرف دارو را قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

چنانچه سؤال یا نکته مهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید:

چنانچه به سیتالوپرام یا هر دارو یا ماده غذایی حساسیت دارید.

چنانچه سابقه یکی از بیماری های کبدی، کلیوی، قلبی، مانیا یا تشنج دارید.

چنانچه حامله هستید یا ممکن است حامله شوید یا در دوران شیردهی به سر می بردید.

چنانچه یکی از داروهای مونو آمینو اکسیداز مانند سلژیلین، مکلوبمايد، فورازولیدون، فنلزین، پروکاربازین یا ترانیل سیپرامین مصرف می نمایید. در صورت اعتیاد یا سوء مصرف هر دارو.

صرف در بارداری و شیردهی:

منافع مصرف دارو باید در برابر مضار آن سنجیده شود. در صورت مصرف این دارو در دوران بارداری به دلیل احتمال اثرات سوء روی جنین با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

به دلیل ترشح سیتالوپرام در شیر مادر در صورت مصرف این دارو در دوران شیردهی با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

احتیاطات:

این دارو را فقط طبق دستور پزشک و دقیقاً مطابق مقدار و مدت زمان توصیه شده مصرف نمایید در طول درمان جهت انجام معاینات دوره ای به طور منظم به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.

این دارو ممکن است در بعضی افراد باعث خواب آلودگی، اختلال در نفکر و یا کاهش کنترل عضلانی شود لذا قبل از رانندگی یا استفاده از ماشینها و دستگاههایی که نیازمند دقت و هوشیاری می باشند باید از واکنش بدن نسبت به این دارو آگاه شوید.

از مصرف این دارو با داروهای مونو آمینو اکسیداز مانند سلژیلین، مکلوبمايد، فورازولیدون، فنلزین، پروکاربازین یا ترانیل سیپرامین خودداری نمایید. در صورت مصرف این دارو با داروهای دیگر بخصوص داروهای متابولیزه شونده توسط آنزیم سیتوکروم P450، داروهای فعال کننده سیستم عصبی مرکزی، ضد تشنج ها، ضد سایکوزها، بنزودیازپین ها، لیتیم، تریپتوفان، داروهای ضد افسردگی، وارفارین و داروهای دیگر که شدیداً به پروتئین پلاسمای باند می شوند با پزشک خود مشورت نمائید.

از قطع مصرف دارو به صورت ناگهانی خودداری نمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک معالج شما تعیین می گردد و تبعیت از دستور پزشک معالج در مورد مقدار و نحوه مصرف این دارو الزامی است. اطلاعاتی که در ذیل ارائه می گردد حدود دوز درمانی دارو را بیان می دارد.

بزرگسالان: بسته به نوع بیماری ۱۰-۶۰ میلی گرم در روز مصرف میشود. مقدار مصرف سیتالوپرام در افراد بالای ۶۵ سال و نیز افراد با عملکرد بد کبدی کمتر می باشد.

دارو را همراه مایعات میل نمایید.

زمان لازم برای ایجاد اثر ضد افسردگی این دارو ممکن است تا ۴ ماه به طول بینجامد، در صورت عدم احساس بهبودی در آغاز درمان، مصرف دارو را قطع ننمایید.

در صورت فراموش کردن مصرف دارو به محض یادآوردن آن را میل نموده و در صورت فرا رسیدن نوبت بعدی دوز فراموش شده را دو برابر نسازید.

عواض جانبی :

همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی عواض ناخواسته‌ای بروز مینماید. اگر چه این عواض ممکن است در یک فرد ظاهر نشود.

در صورت بروز هر یک از عواض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید: ناتوانی جنسی، اختلال بینایی، هیجان، کاهش حافظه، کاهش اشتها، گیجی، اشکال در تنفس، تب، تغییر قاعده‌گی، تکرار ادرار، راش پوستی، خون‌ریزی غیر عادی، کاهش ضربان قلب، سینه دردناک یا بزرگ شدن سینه، ترشح شیر از سینه، آریتمی قلبی، نکروز اپیدرمی، اختلال حرکات عضلانی، کاهش قند خون، گیجی، خواب آلودگی، خشکی دهان، تشنجی مکرر، کاهش انرژی، تشنج، بی اختیاری ادرار، ادرار دردناک، اختلال خلق.

در صورت تداوم علائم زیر به پزشک معالج خود مراجعه نمایید: خواب آلودگی، خشکی دهان، اختلال خواب، درد شکمی، اضطراب، کم اشتها بینی، درد مفصلی-عضلانی، بی حالی، اسهال، سوء هاضمه، کاهش فشار خون، افزایش بزاق، افزایش تعریق، خمیازه کشیدن، میگرن، آبریزش بینی، تغییر ذائقه، لرزش، ساییدن دندان، تغییر غیر معمول وزن، تهوع.

سمومیت :

در صورت مصرف بیش از حد لازم فوراً به پزشک مراجعه نمایید. علائم سمومیت شامل: منگی، خواب آلودگی، تهوع، تاکی کاردی سینوسی (ضربان تند قلب)، تعریق، لرزش می باشد.

اقدامات درمانی در صورت سمومیت با سیتالوپرام شامل شستشوی معده، استفاده از زغال فعال و احیاء قلبی-تنفسی می باشد.

شرایط و نحوه نگهداری :

دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود. از دسترس اطفال دور نگه دارید.

در حمام، نزدیک ظرفشویی و سایر نقاط مرطوب قرار ندهید. داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.

