

## قرص خطدار کلونازپام ۱ و ۲ میلی گرم

کلونازپام یک دارو از دسته بنزو دیازپین ها می باشد که در درمان اختلالات پانیک و اختلالات مشخص تشنجی نظیر صرع مورد استفاده قرار می گیرد.

### یادآوری :

این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است، از مصرف آن در موارد مشابه و یا از توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. دارو را کاملاً مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید مصرف دارو را قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو نیز پرهیز نمایید.

داروها را به طور کلی دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

### راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید.

- چنانچه نسبت به بنزو دیازپین ها، انواع غذاها و افزودنی های آن ها مانند رنگ ها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.

- چنانچه سوء مصرف الكل یا دارو ، بیماری مغزی ، اشکال در بلع ، بیماری های ریوی ، کبدی یا کلیوی ، گلوكوم ، هایپر اکتیویتی ، دپرسیون ، میاستنی گراویس ، پورفیری ، تنگی نفس موقع خواب ، صرع یا ساققه تشنج دارید.

- چنانچه حامله هستید یا ممکن است حامله شوید و یا در دوران شیردهی به سر می بردید.

### صرف در بارداری و شیردهی :

صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی مجاز نمی باشد.

### احتیاطات :

جهت انجام معاینات دوره ای به طور منظم به پزشک معالج خود مراجعه نمایید. در صورتی که این دارو را برای درمان حالات تشنجی استفاده می کنید رعایت این امر در ماه های اول درمانی حائز اهمیت می باشد.

در صورتی که این دارو را با دوز بالا یا برای مدت طولانی مصرف نموده اید به طور ناگهانی مصرف آن را قطع نکنید، جهت قطع نمودن تدریجی مصرف دارو به پزشک خود مراجعه کنید.  
اثرات این دارو به دنبال مصرف الكل و داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی نظیر آنتی هیستامین ها، داروهای سرماخوردگی، ضد اضطراب ها، آرام بخش ها، خواب آورها، نارکوتیک ها، باربیتورات ها، ضد تشنج ها، شل کننده های عضلانی یا داروهای بی حس کننده تشديدة می شود. بنابراین قبل از مصرف هر یک از داروهای فوق با پزشک خود مشورت نمایید و از مصرف الكل اکیداً پرهیز نمایید.

قبل از انجام هر نوع آزمایشات پزشکی، پزشک خود را از مصرف این دارو آگاه نمایید.

هر نوع افکار یا رفتار عجیب و غیر معمول را در طول مصرف این دارو به اطلاع پزشک خود برسانید. تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و یا سایر امور نیازمند به هوشیاری پرهیز نمایید.

## ← مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

اطلاعات زیر حدود دوز درمانی این دارو را بیان می سازد و تبعیت از دستورات پزشک معالج در هنگام مصرف این دارو الزامی است.

### جهت کنترل تشنج :

**بزرگسالان :** ابتدا ۵/۰ میلی گرم ۳ بار در روز قابل افزایش تا حداقل ۲۰ میلی گرم در روز بنا بر تشخیص پزشک معالج.

**نوزادان و کودکان کمتر از ۱۰ سال :** دوز دارو بر اساس وزن بدن و توسط پزشک معالج تعیین می شود.

### جهت کنترل اضطراب و اختلالات پائیک :

**بزرگسالان :** ابتدا ۲۵/۰ میلی گرم ۲ بار در روز قابل افزایش تا حدود ۴ میلی گرم در روز بنابر تشخیص پزشک معالج.

**کودکان :** نحوه مصرف و دوز دارو توسط پزشک معالج تعیین می گردد.  
در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش نمودید تا حدود یک ساعت پس از زمان مصرف می توانید آن را میل نمایید، در غیر این صورت دوز فراموش شده را حذف نموده و دوز بعدی را نیز ۲ برابر نسازید.

## ← عوارض جانبی :

همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی عوارض ناخواسته ای بروز می نماید، اگرچه این عوارض ممکن است در یک فرد ظاهر نشود لیکن در صورت بروز عوارض زیر پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید.

– عوارض کمتر شایع: اضطراب، گیجی، تندی یا بی نظمی ضربان قلب، کم شدن حافظه، افسردگی.  
– عوارض نادر: افکار غیرعادی، تغییرات رفتاری نظیر بد خلقی، تشنج، توهیم، بیقراری، افت فشارخون، ضعف عضلانی، راش های پوستی، گلو درد، تب و لرز، بی خوابی، زخم دهان یا گلو، حرکات غیر ارادی بدن و چشم، خونریزی یا کبوتری غیرعادی، هیجان غیر عادی، حالات عصی یا تحریک پذیری غیر معمول، خستگی و ضعف غیر عادی، زرد شدن چشم ها و پوست.

## ← مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد لازم فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

– علایم مصرف بیش از حد دارو: گیجی، تشنج، منگی، کما، لرزش، کند شدن ضربان قلب، کند شدن رفلکس ها، اشکال در تکلم، تلوتلو خوردن، تنگی نفس و ضعف.

## ← شرایط نگهداری :

– دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.

– دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

