

# کلوبیدوگرل آریا

Clopidogrel (as Hydrogen Bisulfate) 75 mg

کلوبیدوگرل (بصورت هیدروژن سولفات) ۷۵ میلی گرم

کلوبیدوگرل یک داروی ضد تجمع پلاکتی است. این دارو با جلوگیری از اتصال آدنوزین دی فسفات (ADP) به ریپتورهایش در پلاکت مانع از تجمع پلاکت‌ها می‌شود. کلوبیدوگرل به منظور پیشگیری از حملات قلبی عروقی و بیماری‌های ترمبوآمبولیک و کاهش خطر مرگ در بیماری‌های عروقی مصرف می‌گردد.

## یادآوری:

- این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه‌های آن به دیگران خودداری نمایید.
- دارو را کاملاً مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.
- دارو را به طور کلی از دسترس اطفال دور نگه دارید.
- چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

## راهنمایی‌های عمومی:

- قبل از مصرف دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید:
- چنانچه نسبت به این دارو حساسیت دارید.
  - چنانچه نسبت به انواع غذاها و افزودنی‌های آن‌ها مانند رنگ‌ها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.
  - چنانچه مبتلا به بیماری‌های کبدی، خونی و زخم معده هستید.
  - چنانچه از سایر داروها نظیر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (خصوصاً آسپرین) هپارین، وارفارین، فنی‌توئین و تولبوتامید استفاده می‌نمایید.
  - چنانچه تحت اعمال دندانپزشکی و دیگر اعمال جراحی قرار می‌گیرید.

## مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی در زمینه عوارض این دارو بر روی جنین در دوران بارداری و ترشح دارو در شیر انجام نشده است، لذا مصرف این دارو در طول دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد و فواید مصرف دارو در برابر مضرات آن سنجیده شود.

## احتیاطات:

- دارو را فقط طبق دستور پزشک و دقیقاً مطابق مقدار و مدت زمان توصیه شده مصرف نمایید.
- از مصرف هم زمان کلوبیدوگرل با دیگر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی خصوصاً آسپرین بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.

- در صورت انجام اعمال جراحی پزشک یا دندانپزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.
- در صورت مصرف بیش از حد مجاز دارو سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- در صورت عدم تاثیر دارو و ایجاد پهلوی بدن تجویز پزشک دوز دارو را افزایش ندهید.
- در صورت بروز هرگونه خونریزی پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید.

## مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک معالج شما تعیین می‌گردد و تبعیت از دستور پزشک معالج در مورد مقدار و نحوه مصرف آن الزامی است.  
حدود دوز درمانی کلوبیدو-گرل روزانه ۷۵ میلی گرم می‌باشد.  
چنانچه یک نوبت مصرف دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری آن را میل نمایید. در صورتی که نوبت مصرف بعدی دارو بود دوز فراموش شده را میل نکنید و دوزهای بعدی را نیز دو برابر نسازید.

## عواض جانبی:

همراه با اثرات درمانی یک دارو ممکن است عوارض ناخواسته‌ای بروز نماید. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید:

### با شیوع بیشتر:

درد قفسه سینه، واکنش‌های حساسیتی پوست، عفونت‌های دستگاه تنفسی فوکانی.

### با شیوع کمتر:

بی‌نظمی در ضربان قلب، اختلالات تنفسی، ادم، خونریزی از دستگاه گوارش و عفونت‌های ادراری.

در صورت برطرف نشدن عوارض زیر و تداوم آن پزشک خود را در جریان قرار دهید:

### با شیوع بیشتر:

دردهای شکمی، ضعف عضلانی، سوزش معده.

### با شیوع کمتر:

اضطراب، یبوست، تهوع، خارش پوست و راش‌های پوستی.

## شرایط و نحوه نگهداری:

- از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی برگه راهنمای: ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۰

