

# اس و-کپ® ۲۰ و ۴۰

## ESO-CAP® 20 & 40

Esomeprazole

Capsules (E.C. Pellets)

اس امپرازول

کپسول (محتوی پلت انتریک کوتد)

### مشخصات دارو (اس امپرازول ۲۰):

کپسول (محتوی پلت انتریک کوتد) اس امپرازول آریا ۲۰ با بدن و درب بنفس کم رنگ، حاوی ۲۰ میلی گرم اس-امپرازول میباشد. این دارو به تعداد ۱۴ عدد در قوطی های پلی اتیلنی با درب سفید حاوی سیلیکاژل بسته بندی میگردد.

### مشخصات دارو (اس امپرازول ۴۰):

کپسول (محتوی پلت انتریک کوتد) اس امپرازول آریا ۴۰ با بدن و درب بنفس رنگ، حاوی ۴۰ میلی گرم اس-امپرازول میباشد. این دارو به تعداد ۱۴ عدد در قوطی های پلی اتیلنی با درب سفید حاوی سیلیکاژل بسته بندی میگردد.

### موارد مصرف دارو:

اس امپرازول از دسته دارویی بنزایمیدازول ها می باشد. این دارو از طریق مهار پمپ H+/K<sup>+</sup> ATP as پیشگیری رفلکس گاسترو ازو فاژیت، اولسر پیتیک، درمان هلیکوباتر پیلوئی همراه داروهای دیگر و پیشگیری از ایجاد زخم های گوارشی ناشی از مصرف طولانی مدت داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی تجویز می گردد.

### راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید، حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید، مصرف دارو را قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

- چنانچه سؤال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.  
- از خردکردن، جویدن و یا باز کردن کپسول خودداری نمایید.

### موارد منع مصرف:

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید:

- چنانچه نسبت به هریک از داروهای مهارکننده اسیدمعده و یا سایر مواد حساسیت دارید.

- چنانچه باردار هستید و یا احتمال بارداری وجود دارد یا در دوران شیردهی به سر می بردید.

- چنانچه از داروی دیگری خصوصاً وارفارین استفاده می نمایید.

### صرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی در زمینه عوارض این فرآورده بر روی جنین در دوران بارداری انجام نشده است، لذا مصرف آن در طول دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد و فواید مصرف فرآورده در برابر مضرات آن سنجدیده شود.

### احتیاطات:

- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

- در صورت مصرف طولانی مدت اس امپرازول بیمار باید جهت پیگیری سلامت معده مورد آزمایش قرار گیرد.

- در صورت واکنش های حساسیتی مانند آنتی بوادم، برونوکو اسپاسم و کهیر با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

- این دارو را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

#### تداخلات دارویی:

- در صورت استفاده از سایر داروها "حتماً" پزشک خود را مطلع سازید.
- در صورت مصرف همزمان اس امپرازول با داروهایی چون آموکسی سیلین، کلاریتروماسین، دیگوکسین، وارفارین، کتونکنال و املاح آهن با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

#### مقدار و نحوه مصرف:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

- دوز درمانی ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم در روز به مدت ۴ تا ۸ هفته و دوز نگهدارنده ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم در روز، بر حسب نوع بیماری می باشد.
- در بیماران مبتلا به هلیکوباکترپیلوری ۴۰ میلی گرم از دارو یک بار در روز همراه کلاریتروماسین و آموکسی سیلین به مدت ۱۰ روز تجویز می شود.
- به منظور پیشگیری از ایجاد زخم های گوارشی ناشی از مصرف طولانی مدت داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم در روز این دارو به مدت ۶ ماه تجویز می گردد.

- دارو را حداقل یک ساعت قبل از غذا مصرف نمایید.

- در صورت فراموش کردن مصرف دارو به محض به یادآوردن آن را میل نموده و در صورت فرا رسیدن نوبت مصرف بعدی، دوز فراموش شده را دو برابر نسازید.
- دارو را به طور کامل بلعیده و از خردکردن، جویدن و یا باز کردن کپسول خودداری نمایید.

#### عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

- واکنش های پوستی، سندرم استیونس جانسون (التهاب مفاصل، خارش، قرمزی پوست، خستگی و ضعف)، تب، افزایش ضربان قلب.

- در صورت برطرف نشدن عوارض زیر و تداوم آن پزشک خود را در جریان قرار دهید:  
- اسهال، درد در پشت، سرفه، خواب آلودگی، سردرد، گیجی، تهوع، استفراغ، اختلالات گویایی، اضطراب، درد شکمی.

#### سمومیت:

- در صورت مصرف بیش از حد لازم فوراً به پزشک مراجعه نمایید.

#### علائم مسمومیت شامل:

- تاری دید، گیجی، افزایش ضربان قلب، خواب آلودگی، قرمزی پوست خصوصاً در گردن و صورت، برافروختگی، سردرد و تهوع می باشد.

#### شرایط و نحوه نگهداری:

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.  
- پس از هر بار مصرف، در پوش ظرف را محکم ببندید.



Refrence: USP DI 2007, Vol.2, Page: 1283 - 1285

Website: www.aryapharm.com

ARYA Pharmaceutical Co. Tehran-Iran