

مشخصات دارو:

هر قرص روکش دار حاوی ۳۲۰ میلی گرم جمی فلوکساسین (به صورت مزینات) می باشد، فکتی جم® ۳۲۰ در جعبه های مقوای حاوی یک بلیستر ۵ عددی بسته بندی و عرضه می گردد.

موارد مصرف دارو:

فکتی جم® ۳۲۰ در دسته داروهای ضد باکتری فلوروکینولون ها می باشد و در درمان عفونت های ناشی از باکتری ها استفاده می شود. این دارو در درمان برونشیت شدید و زمین باکتریایی ناشی از هموفیلوس اینفلوانزا و پارا اینفلوانزا، مورکسلا کاترالیس، استرپتوکوک پنومونیه و پنومونی متوسط تا شدید ناشی از کلامیدیا پنومونیه و کلیسیلا پنومونیه، ام کاترالیس، مایکوپلاسما و اس پنومونیه تجویز می گردد.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- حساسیت به فکتی جم®، آنتی بیوتیک های فلوروکینولون و یا هر یک از اجزای محصول
- در صورت مصرف ترکیبات آنتی آرتیمیک کلاس Ia و III، آنتی اسیدهای حاوی الومینیوم و یا منیزیم، آنتی سایکوتیک، سبزیپراید، دایدانوسین، ایترومایسین، فروسوفولات، مولتی ویتامین های حاوی روی و دیگر کاتیون های فلزی، سوکرافیت، پابین بودن غلظت پنتاسیم و منیزیم.
- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید، حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید مصرف دارو را به هیچ عنوان قطع نکند و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.
- فکتی جم® را می توان همراه غذا یا با فاصله از غذا استفاده کرد.
- فکتی جم® را همراه یک لیوان پر آب میل کنید.
- دوره درمان با فکتی جم® را کامل نمایید.

موارد منع مصرف:

- مصرف این دارو (به غیر از موارد خاص) در افرادی که مشکلات پزشکی زیر را دارند، ممنوع می باشد:
- اختلالات الکترولیت شامل پابین بودن پنتاسیم یا منیزیم.
- حساسیت شدید به فکتی جم® و یا هر یک از اجزای محصول.
- در صورت داشتن اختلال سیستم اعصاب مرکزی مانند سرع، مشکلات عصبی، سابقه تشنج.
- مشکلات کلیوی و کبدی، آرتریت و سابقه طولانی بودن زمان QT در نوار قلبی.
- این دارو از نظر مصرف در دوران بارداری در گروه C می باشد، مطالعات کافی درباره مصرف در دوران بارداری و شیردهی و تاثیر آن در باروری انجام نشده است، لذا بهتر است در دوران بارداری و شیردهی مصرف نگردد، مگر اینکه منافع و مزیت استفاده آن برای جنین و یا نوزاد بسیار بیشتر از خطرات آن باشد.

هشدارها:

- بیمارانی که به یکی از آنتی بیوتیک های فلوروکینولونی و یا سایر کینولون ها مانند ساینوکساسین، نالیدیکسیک اسید حساسیت داشته باشند ممکن است به فکتی جم® نیز حساسیت مشابه داشته باشند، لذا قبل از مصرف این دارو با پزشک مشورت نمایید.
- بیمارانی که مشکل اسهال، سابقه واکنش های ازیداد حساسیت، بیماری کبدی دارند و بیمارانی که داروهای ضد انعقاد مصرف می نمایند باید تحت نظارت کامل پزشک این دارو را مصرف نمایند.
- در حین مصرف فکتی جم® در صورت بروز درد، ورم یا التهاب تاندون یا ضعف یا عدم توانایی در استفاده از مفاصل، مصرف را قطع کرده و پزشک معالج خود را آگاه کنید.
- مصرف هم زمان این دارو با ترکیبات کورتیکواستروئید ممکن است که خطر پاره شدن تاندون را به ویژه در افراد سالخورده افزایش دهد.

احتیاطات:

- فکتي ڄم[®] ممکن است باعث گيجی يا خواب‌آلودگی شود، در نتيجه حين مصرف فکتي ڄم[®] در انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند مانند رانندگی و کار با ماشين الات احتیاط لازم انجام شود.
- ضمن درمان با این دارو به مدت طولانی در معرض آفتاب قرار نگیرید و از کرم‌های ضد آفتاب استفاده نمایید.

تداخلات دارویی:

- مصرف فکتي ڄم[®] در بیماران که داروهای انتی‌آرتمیک نظیر آمپودارون، پروکایتامید و کینیدین و هم چنین سوتالول دریافت می‌کنند توصیه نمی‌شود و ممکن است منجر به طولانی شدن فاصله QT در نوار قلبی شود.
- هم چنین مصرف هم زمان فکتي ڄم[®] با ترکیبات انتی‌اسید حاوی منیزیم يا الومینیوم و فروس سولفات يا مولتی‌ویتامین‌های حاوی روی و يا سایر کاتیون‌های فلزی، دسترسی سیستمیک دارو را کاهش می‌دهد و نباید هم زمان مصرف شوند، این داروها باید ۲ ساعت قبل و يا ۲ ساعت بعد از فکتي ڄم[®] مصرف شوند.
- داروی پروپنسید کلیرنس کلوی فکتي ڄم[®] را کاهش می‌دهد.
- در صورت مصرف داروی سوکرافیت باید فکتي ڄم[®] حداقل ۲ ساعت بعد از آن مصرف شود.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:
- در درمان پرونشتیت مزمن: روزانه ۳۲۰ میلی‌گرم فکتي ڄم[®] هر ۲۴ ساعت به مدت ۵ روز.
- در درمان پنومونی متوسط تا شدید: روزانه ۳۳۰ میلی‌گرم فکتي ڄم[®] هر ۲۴ ساعت به مدت ۷ روز.
- برای بیماران با کلیترانس کراتینین ۴۰ میلی‌لیتر در دقیقه يا کمتر، نصف مقدار ذکر شده، ۱۶۰ میلی‌گرم هر ۲۴ ساعت تجویز می‌شود.
- مقدار دوز و دوره مصرف را افزایش ندهد و دستور پزشک را رعایت نمایید.
- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید.
- اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله پس از یادآوری آن را مصرف نمایید ولی چنانچه زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه داده و مقدار بعدی را نیز دو برابر نکنید.

عوارض جانبی دارو:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، برخی از عوارض جانبی معمول دارو به شرح ذیل می‌باشد:
- راش‌های پوستی، سردرد، دردهای شکمی، اسهال، تهوع، استفراغ، گيجی.
- در صورت بروز عوارض جانبی زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:
- بروز واکنش‌های اذیاد حساسیت، زردی پوست يا چشم‌ها، هذیان، بی‌قراری، لرزش، بی‌حسی يا احساس درد و ضعف در بازوها و دست‌ها يا پاها، تنگی نفس، آنمی، لکوپنی، ترموسیتوپنی، احساس ناراحتی و خشکی در گلو.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری دارو:

- دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- دارو را از بسته بندی اصلی خود خارج نکنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

Reference:

USP DI 2007, Vol II, Page 1510 to 1514
Drug Fact and Comparison 2010, Vol 1, Page 1991 to 1992
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی برگه راهنما: ۱۳۹۶/۵/۳



www.aryapharm.com

info@aryapharm.com

تولید شده در شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص)

ایران - تهران ۳ - ۸۱ ۹۸ ۹۸ ۴۴