

مشخصات دارو

کپسول‌های گاباپنتین آریا ۱۰۰ و ۳۰۰ در بلیسترهای ۱۰ عددی در داخل جعبه‌های مقوایی حاوی ده بلیستر بسته بندی می گردند.

- موارد مصرف دارو:

گاباپنتین یک داروی ضد صرع است که همراه با دیگر داروهای ضد صرع در درمان صرع پارشیال همراه یا بدون ژنرالیزه شدن ثانویه (در سنین بالاتر از ۳ سال) به کار می رود. این دارو همچنین در درمان دردهای عصبی ناشی از بیماری دیابت مورد استفاده قرار می‌گیرد. - راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

- چنانچه مبتلا به بیماریهای کلیوی هستید به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمائید. - چنانچه از سایر داروها خصوصاً آنتی اسیدها استفاده می نمائید به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمائید.

- موارد منع مصرف:

چنانچه نسبت به این دارو حساسیت دارید.

- مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی در زمینه عوارض این دارو بر روی جنین در دوران بارداری انجام نشده است. گاباپنتین از جفت عبور نموده و در شیر ترشح می شود، لذا مصرف این دارو در طول دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد و فواید مصرف دارو در برابر مضرات آن سنجیده شود.

- هشدارها:

در منابع، هشدار خاصی ذکر نشده است.

- احتیاطات:

- دارو را فقط طبق دستور پزشک و دقیقاً مطابق مقدار و مدت زمان توصیه شده مصرف نمائید. - از مصرف همزمان گاباپنتین با دیگر داروهای موثر بر روی سیستم عصبی بدون تجویز پزشک خودداری نمائید.

- مراقب دوبینی، خواب آلودگی و عدم تمرکز ناشی از مصرف دارو باشید و تا مشخص شدن اثر دارو از انجام کارهایی نظیر رانندگی که به دقت بالا نیاز دارند خودداری نمائید.

- با مراجعه منظم به پزشک از پیشرفت بهبودی خود اطلاع حاصل نمائید.

- در صورت مصرف بیش از حد مجاز دارو سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمائید.



- در صورت عدم تأثیر دارو و ایجاد بهبودی بدون تجویز پزشک دوز دارو را افزایش ندهید.
- دارو را به طور ناگهانی و بدون تجویز پزشک قطع نکنید.

- **تداخلات دارویی:**

- در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.
- در صورت مصرف همزمان این دارو و داروهای موثر بر روی سیستم عصبی، آنتی اسیدها خصوصاً آنتی اسیدهای حاوی منیزیم و کلسیم، مورفین و الکل با پزشک خود مشورت نمایید.
- **مقدار ونحوه صحیح مصرف دارو:**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:
- دوز درمانی گاباپنتین به طور معمول حدود ۹۰۰-۱۸۰۰ میلی گرم در روز می باشد که می تواند به ۲۴۰۰ تا ۳۶۰۰ میلی گرم در روز نیز افزایش یابد. دوز درمانی معمولاً در سه دوز منقسم مصرف می شود که فواصل مصرف آنها حداکثر ۱۲ ساعت می باشد. افزایش دوز بصورت تدریجی صورت می گیرد.

- چنانچه یک نوبت مصرف دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری آن را میل نمایید.
- در صورتیکه کمتر از ۴ ساعت به نوبت مصرف بعدی دارو بود دوز فراموش شده را میل نکنید و دوزهای بعدی را نیز دو برابر نسازید.

- **عوارض جانبی:**

- اگرچه این عوارض ممکن است در یک فرد ظاهر نشود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید.

آتاکسی، نیستاگموس، اضطراب، گریه، افسردگی، هایپرکاینزیا، اختلال در تمرکز و یادگیری، لوکوپنی.
- در صورت بر طرف نشدن عوارض ذیل و تداوم آن پزشک خود را در جریان قرار دهید:
خواب آلودگی، خستگی، درد عضلانی، ادم دست و پا، لرزش، اختلال در دید، اختلالات گوارشی، یبوست، اسهال و تهوع، سر درد.

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

- **شرایط نگهداری دارو:**

- دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

- تا موقع مصرف دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.

- دارو را از بسته بندی اصلی خود خارج نکنید.

- **نام، آدرس، تلفن، Website:**

کارخانه داروسازی آریا

آدرس:

کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران، کرج، خیابان داروپخش، کارخانه داروسازی آریا

تلفن: ۳-۴۴۹۸۱۰۸۱



Website: www.aryapharm.com

Ref: USPDI 2007, Vol2

ARYA Pharmaceutical Co.
Tehran-Iran