

## قرص پیوسته رهش ایزوسور بایدادی نیترات ۴۰ میلی‌گرم

## یادآوری:

این دارو به شکل پیوسته رهش برای داشتن اثر دارویی در زمان طولانی تر ساخته شده است. در موقع مصرف از جویدن یا شکستن این قرص ها خودداری نمایید. این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است. از مصرف آن در مورد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

## راهنمایی‌های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید.
- چنانچه قبلاً نسبت به ایزوسور بایدادی سایر نیترات ها حساسیت داشته اید.
  - چنانچه داروی دیگری مصرف می کنید.
  - چنانچه تحت رژیم به خصوص کم نمک و یا کم قند هستید و یا نسبت به بعضی از مواد غذایی و یا افزودنی های آن ها حساسیت دارید.
  - چنانچه حامله هستید و یا ممکن است حامله شوید و یا در دوران شیردهی به سر می برید.
  - چنانچه سابقه بیماری کلیوی، کبدی، روده‌ای، پرکاری تیروئید، کم خونی شدید و یا آب سیاه دارید.
  - چنانچه اخیراً دچار حمله قلبی یا پارگی رگ های مغزی و یا صدمه قلبی شده اید.
  - چنانچه داروهای دیگری به خصوص داروی فشارخون مصرف می کنید.

## هنگام مصرف قرص ایزوکور ۴۰® نکات زیر را رعایت کنید:

- برای به دست آوردن بهترین نتیجه این دارو را درست مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.
- این دارو برای کم کردن تعداد حمله های آنژیینی تجویز می شود.
- به علت کندی اثر ( قرص پیوسته رهش ) ممکن است در مواردی که حمله شروع شده باشد تأثیر مطلوب نداشته باشد، در صورت نیاز به داروی سریع الأثر با مراجعه به پزشک خود داروی مناسب را دریافت کنید.
- قرص ایزوکور ۴۰® را همراه با یک لیوان آب در حالی که معده خالی می باشد میل نمایید.
- چنانچه یک ساعت قبل از غذا و یا دو ساعت بعد از غذا میل شود تأثیر بهتر و سریعتری خواهد داشت.
- قرص ایزوکور ۴۰® پیوسته رهش را نباید شکست و یا جوید.
- چنانچه یک نوبت خوردن این دارو را فراموش کردید، هر چه زودتر آن را میل نمایید ولی چنانچه زمان به یاد آوردن حدود ۶ ساعت یا کمتر به وقت مقرر دارو بود از مصرف آن خودداری کرده نوبت بعدی را مطابق دستور مصرف نمایید و مصرف نوبت بعدی را دو برابر نکنید.

## احتیاطات:

- چنانچه این دارو را به طور منظم و برای مدت چندین هفته یا بیشتر مصرف می کنید، یک باره

مصرف آن را قطع نکنید قطع ناگهانی این دارو ممکن است باعث حملات آنژین شود.

- برای بهترین روش قطع تدریجی دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
- با مصرف این دارو ممکن است گیجی، ضعف و یا احساس سبکی سر به خصوص در موقع برخاستن سریع از حالت خوابیده یا نشسته عارض شود. آهسته از جای خود بلند شوید و در صورت احساس سرگیجه و ضعف برای مدتی بنشینید و یا دراز بکشید.
- عوارض گفته شده در بالا با مصرف الکل، ایستادن به مدت طولانی، کار بدنی شدید و یا بودن در هوای گرم بیشتر احتمال بروز دارند.
- بعد از مصرف این دارو ممکن است برای مدت کوتاهی دچار سر درد شوید. این عارضه معمول دارو می باشد که با ادامه مصرف دارو تخفیف پیدا می کند، چنانچه این سر دردها ادامه پیدا کرد و یا شدید بود به پزشک خود اطلاع دهید.

### عوارض جانبی:

همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی ممکن است عوارض ناخواسته ای نیز بروز کند. اگر چه همیشه و یا همه عوارض گفته شده ممکن است در یک فرد ظاهر نشود، لیکن در صورت بروز هر عارضه ای به پزشک خود مراجعه نمایید.

- عوارض نادر: تاری دید، خشکی دهان، سر درد شدید یا طولانی.
- علائم و عوارض مصرف زیاد: کبود شدن لب ها، پشت ناخن و کف دست ها، سرگیجه یا ضعف، احساس فشار زیاد در سر، کوتاهی نفس، خستگی با ضعف غیر عادی، تند شدن و ضعیف شدن ضربان قلب، تب و تشنج.

عوارض ناخواسته دیگری نیز ممکن است بروز نماید که احتیاج به مراقبت پزشکی ندارد. این عوارض در طول درمان که بدن شما خود را با دارو تطبیق می دهد ممکن است از بین برود ولی چنانچه عوارض مشروحه زیر ادامه پیدا کرد و یا تحمل ناپذیر بودند به پزشک خود مراجعه نمایید:

گیجی یا احساس سبکی در سر به خصوص هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته، سر درد، ضربان تند قلب، گر گرفتگی در صورت و گردن، دل به هم خوردگی و استفراغ و بیقراری. اغلب داروها به طور اختصاصی روی سالمندان آزمایش نشده اند که آیا نحوه اثر و یا عوارض جانبی آن ها مانند بزرگسالان جوانتر است یا نه، توصیه می شود که در حین مصرف این دارو چنانچه عوارض و یا علائم غیر عادی مشاهده کردید به پزشک و یا داروساز خود مراجعه نمایید.

### مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود ( مگر با دستور پزشک معالج ).

### شرایط نگهداری:

- از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

