

Tablet

Loratadine ARYA 10mg

Loratadine

قرص

لوراتادین آریا ۱۰ میلی گرم

لوراتادین

لوراتادین یک داروی آنتی هیستامین فاقد اثرات خواب آور می باشد که در درمان یا کاهش نشانه های حالات آلرژیک استفاده می گردد.

یادآوری:

این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
از مصرف بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک معالج خودداری نمایید.
داروها را به طور کلی از دسترس اطفال دور نگهدارید.
چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک خویش تماس بگیرید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو موارد ذیل را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید.
- چنانچه قبلاً نسبت به این دارو حساسیت داشته اید.
- چنانچه نسبت به انواع غذاها و افزودنی های آن مانند رنگ یا مواد نگهدارنده حساسیت دارید.
- چنانچه مبتلا به بیماری های کبد یا مثانه، بزرگی پروستات، تکرر ادرار یا گلوکوم می باشید.
- چنانچه هر داروی دیگری به خصوص مسکن ها یا داروهای ضد افسردگی مصرف می نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی مجاز نمی باشد.

احتیاطات:

هر چند که این دارو بر خلاف سایر داروهای آنتی هیستامین ایجاد خواب آلودگی نمی نماید با این وجود از عکس العمل بدن خود نسبت به این دارو پیش از کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند اطمینان حاصل نمایید.
در صورت مصرف هم زمان هر داروی دیگری با پزشک خود مشورت نمایید.
از مصرف الکل و نوشابه های الکلی پرهیز نمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف این دارو توسط پزشک معالج شما تعیین می گردد. اطلاعاتی که ذیلاً ارائه

Pantone 341 C

می گردد حدود دوز درمانی تجویز شده را بیان داشته و تبعیت از دستورات پزشک معالج در مورد نحوه‌ی مصرف این دارو الزامی است.

بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۶ سال: روزانه ۱۰ میلی گرم معادل یک قرص.

کودکان ۲ تا ۶ سال: روزانه ۵ میلی گرم معادل نصف قرص.

چنانچه یک نوبت مصرف دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری آن را میل نمایید و در صورتی که نزدیک زمان مصرف دوز بعدی دارو بود، دوز فراموش شده را حذف کرده و دوز بعدی را نیز دو برابر نسازید.

عوارض جانبی:

همواره با اثرات درمانی یک دارو گاهی ممکن است عوارض ناخواسته‌ای نیز بروز نماید. هر چند همیشه و یا همه‌ی عوارض ذیل ممکن است در یک فرد ظاهر نشود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید:

خستگی، تهوع، سر درد، ریزش مو، شوک آلرژیک، تندی ضربان قلب، خشکی دهان، تاری دید، گلو درد، بشورات جلدی، هیجان و ناراحتی عصبی.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

شرایط نگهداری:

- دارو را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.

