

قرص لورواستاتین ۲۰ میلی گرم

لورواستاتین یک دارو از دسته مهار کننده های آنزیم هیدورکسی متیل گلوتاریل کو آنزیم ردوکتاز می باشد. از آنجا که این آنزیم برای سنتز کلسترول ضروری است مهار آن سبب کاهش میزان کلسترول خون می شود.

یادآوری :

این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
داروها را به طور کلی دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید.
چنانچه نسبت به این دارو یا سایر داروهای مهار کننده آنزیم هیدورکسی متیل گلوتاریل کو آنزیم A ردوکتاز، انواع غذاها و افزودنی های آن ها مانند رنگ ها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.

چنانچه سابقه سوء مصرف الكل، بیماری کبدی، حملات تشنجی (صرع) کنترل نشده، پیوند عضو و درمان برای جلوگیری از رد آن داشته اید و یا اینکه اخیراً تحت عمل جراحی وسیع قرار گرفته اید.

چنانچه حامله هستید یا ممکن است حامله شوید و یا در دوران شیردهی به سر می بردید.

صرف در بارداری و شیردهی :

صرف این دارو در طول دوران بارداری و شیردهی اکیداً ممنوع می باشد.

احتیاطات :

این دارو را فقط طبق دستور پزشک و دقیقاً مطابق مقدار و مدت زمان توصیه شده مصرف نمایید.

جهت انجام معاینات دوره ای به طور منظم به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
صرف این دارو را بدون مشورت با پزشک خود قطع نکنید، زیرا قطع ناگهانی مصرف این دارو ممکن است باعث افزايش کلسترول خون شود. پزشک شما رژیم غذایی خاصی را برای جلوگیری از بروز این حالات پیشنهاد خواهد کرد.
هنگام مصرف این دارو رژیم غذایی توصیه شده توسط پزشک معالج خود را دقیقاً مراعات

نمایید.

قبل از انجام هر نوع عمل جراحی (شامل جراحی دندان) یا جراحی های اورژانس، پزشک یا دندانپزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.
در صورت استفاده از داروهای سیکلوسپورین، جم فیروزیل، نیاسین و سایر داروها با پزشک خود مشورت نمایید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک شما تعیین می گردد و تبعیت از دستور پزشک معالج در هنگام مصرف این دارو الزامی است. مقدار مصرف روزانه این دارو ۲۰ الی ۸۰ میلی گرم در یک یا چند دوز منقسم می باشد.
در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری آن را میل نکنید و دوزهای بعدی را نیز دو برابر نسازید.

عوارض جانبی :

همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی ممکن است عوارض ناخواسته ای بروز نماید، اگرچه همه این عوارض ممکن است در یک فرد ظاهر نشود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید:
تب، درد یا گرفتگی عضلانی، درد شدید معده، خستگی یا ضعف غیرعادی، در صورت تداوم یافتن عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید:
عوارض شایع تر : یبوست، اسهال، گیجی، سردرد، نفخ و سوزش معده، تهوع، راش های پوستی، درد معده.

عوارض نادر : کاهش توانایی جنسی، بی خوابی.

در صورت بروز هر عارضه دیگری غیر از عوارض ذکر شده فوق، پزشک خود را در جریان قرار دهید.

شرایط نگهداری :

از دسترس اطفال دور نگهدارید.
دور از نور و رطوبت ، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
در حمام، نزدیک ظرفشویی آشپزخانه و یا سایر نقاط مرطوب قرار ندهید.
داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.
از نگهداری دارو در یخچال یا فریزر خودداری کنید.

