

قرصی روکشدار مزالازین ۵۰۰

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

الف - راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

۱- وجود هر نوع حساسیت نسبت به سالیسیلاتها

۲- در صورت وجود نارسائی در کلیه ها

۳- بدون تجویز پزشک داروی دیگری همراه این دارو مصرف ننمایید.

دارو می بایست بطور کامل بلعیده شود ، قسمت خارجی روکش نباید شکسته شود.

در صورتیکه پس از مصرف، دارو بشکل اولیه در مدفوع مشاهده گردد، حتماً با پزشک خود تماس بگیرید.

ب - مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی مجاز نمی باشد مگر در موارد اضطراری به تشخیص پزشک.

پ - احتیاطات :

قبل از شروع درمان با این دارو و همچنین حین درمان می بایست عملکرد کلیوی ارزیابی گردد .

ت - مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است :

دوز دارو ۵۰۰ میلی گرم (یک قرص) سه بار در روز قبل از وعده غذایی همراه با یک لیوان کامل آب می باشد.

ث - عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود . اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

شدت پیدا کردن علائم کولیت، عوارض عصبی (افسردگی عصبیت) عوارض قلبی عروقی، ناراحتی های گوارشی (بی اشتها، اسهال خونی، خشکی دهان، سنگ صفرا) ناراحتی های پوستی نظیر خشکی پوست، کهیر، ریزش موضعی موی سر، ناراحتی های ریوی (آسم)، نقرس، درد گوش و درد چشم، ناراحتی های ادراری نظیر وجود خون در ادرار و بندرت هپاتیت.

ج - مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده پزشک، بیمار را به بیمارستان منتقل نماید.

چ - شرایط نگهداری :

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نماید.
دارو را دور از نور مستقیم و حرارت نگهداری نماید.
از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نماید.

REF: USP DI 2007, Vol 2 / P 1931-1933



www.aryapharm.com
info@aryapharm.com

تولید شده در شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص)
ایران - تهران
۴۴۹۸۱۰۸۱ - ۳