

قرصی و روکشدار متفورمین ۵۰۰ میلی گرم

متفورمین در درمان دیابت غیر وابسته به انسولین (دیابت تایپ II) در بیمارانی که رژیم غذایی و ورزش در پایین آوردن قند خون آنها به تنهایی موثر نبوده و نیز مواردی از دیابت وابسته به انسولین که نشانه های بیماری علی رغم تزریق انسولین به خوبی کنترل نشده اند به کار می رود.

یادآوری:

- این دارو برای بیماری کتونی شما تجویز شده است از مصرف مشابه آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- این دارو می بایست فقط طبق دستور پزشک در اختیار شما قرار گیرد.
- این دارو را کاملاً مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید. حتی اگر در طول مصرف بهبودی نمودید، مصرف دارو را قطع نکنید.
- داروها را به طور کلی از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- چنانچه سوال یا نکته مهمی به نظر تان رسید با پزشک یا داروساز خویش تماس بگیرید.

الف - راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو موارد ذیل را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید.
- چنانچه قبلاً نسبت به این دارو حساسیت داشته اید.
- چنانچه نسبت به انواع غذاها و افزودنی های آنها مانند رنگ ها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.
- چنانچه حامله هستید یا ممکن است حامله شوید و یا در دوران شیردهی به سر می برید.
- چنانچه هر نوع داروی دیگری مصرف می نمایید.
- چنانچه مبتلا به بیماری های قلبی عروقی، کبدی، کلیوی، کتواسیدوز، لاکتیک اسیدوز، سوختگی، دهیدراتاسیون، اسهال شدید، تب بالا، عفونت، مصدومیت، جراحی، کتوآوری، استرس شدید، پرکاری غدد فوق کلیوی، تهوع، بیماری های دستگاه گوارش، پرکاری یا کم کاری غده تیروئید یا هیپوفیز، سوء تغذیه و یا هر نوع بیماری دیگری که می تواند بر روی میزان قند خون تاثیر گذار باشد.

ب - مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع می باشد.

پ - احتیاطات:

- بدون مشورت با پزشک خویش از مصرف هر نوع داروی دیگر بخصوص داروهایی که جهت تهیه نیازی به نسخه ندارند نظیر آسپرین، داروهای سرماخوردگی، آسم، سرفه، تب یونجه، ناراحتی های سینوسی و داروهای کنترل کننده اشتها خودداری نمایید.
- مراقب علائم کاهش قند خون باشید و در صورت بروز هر یک از آنها سریعاً قند یا نوشابه های حاوی قند میل نمایید. این علائم شامل اضطراب، گیجی، کاهش قدرت تمرکز، خواب آلودگی، تاری دید، تعریق سرد، سردی پوست، گرسنگی بیش از حد، سر درد، تهوع، تندی ضربان قلب و خستگی یا ضعف مفرط می باشد.

■ مراقب علائم لاکتیک اسیدوز باشید و در صورت بروز هر یک از آنها سریعاً به پزشک مراجعه نمایید. این علائم شامل اسهال، درد شدید یا گرفتگی عضلانی، کم عمق و سریع شدن تنفس و خواب آلودگی می باشد.

■ مراقب علائم افزایش قند خون باشید و در صورت بروز آنها به پزشک مراجعه نمایید. این علائم شامل تشنگی بیش از حد، خستگی، درد معده، خواب آلودگی، تهوع و استفراغ، کاهش اشتها، تکرر ادرار، خشکی دهان، خواب آلودگی و تاری دید و نیز علائم کتواسیدوز شامل استشمام بوی خاص میوه از دهان، خشکی و قرمزی پوست و تنفس سریع و عمیق می باشد.

■ از مصرف الکل و نوشابه های الکلی پرهیز نمایید.

■ به طور مداوم قند خون و کتون ادرار را آزمایش نمایید.

ت - مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و شیوه مصرف این دارو را پزشک برحسب شرایط جسمی و بیماری شما تعیین می کند و تبعیت از دستورات پزشک معالج در مورد مقدار و نحوه مصرف این دارو الزامی است. این دارو را به هنگام مصرف غذا و به همراه یک لیوان بزرگ آب میل نمایید.

ث - عوارض جانبی :

همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی ممکن است عوارض ناخواسته ای بروز نماید اگرچه همیشه و یا همه عوارض گفته شده ممکن است در یک فرد ظاهر نشود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید.

◀ عوارض لاکتیک اسیدوز شامل اسهال، تنفس کوتاه و سریع، درد یا اسپاسم عضلانی، خستگی، ضعف و خواب آلودگی غیرعادی.

◀ عوارض کاهش قند خون شامل حالت اضطراب، گیجی، تاری دید، تعریق سرد، سردی پوست، کاهش قدرت تمرکز، گرسنگی بیش از حد، تندی ضربان قلب، سردرد، تهوع و لرزش می باشد. در صورت برطرف نشدن عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید :

◀ تغییر طعم دهان، نفخ، سردرد، کاهش اشتها، تهوع، درد معده و کاهش وزن.

◀ در صورت بروز هرگونه عارضه دیگری به غیر از عوارض فوق با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

ج - مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد لازم فوراً با پزشک یا اورژانس تماس بگیرید.

چ - شرایط و نحوه نگهداری :

• دارو را دور از نور مستقیم و حرارت نگهداری نمایید.

• از دسترس اطفال دور نگهدارید.

• از نگهداری دارو در یخچال خودداری نمایید.

• داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.

