

پنتوسک® ۲۰ و ۴۰

قرص انتریک کوند پنتوپرازول ۲۰ و ۴۰ میلی گرم

مشخصات دارو:

قرص‌های انتریک کوند پنتوسک® ۲۰ حاوی ۲۰ میلی‌گرم پنتوپرازول (به صورت سدیم سسکوئید هیدرات) می‌باشد. قرص‌های انتریک کوند پنتوسک® ۴۰ حاوی ۴۰ میلی‌گرم پنتوپرازول (به صورت سدیم سسکوئید هیدرات) می‌باشد.

طریقه مصرف:

به طور کامل بلعیده شود، از جویدن یا خوردن آن خودداری نمایید، بهتر است قبل از صبحانه مصرف شود.

کاربرد و میزان مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است و از دسته داروهای گوارشی مهارکننده پمپ پروتون می‌باشد. پزشک شما میزان داروی مورد نیاز شما را تعیین می‌کند. دوزهای معمول این دارو به شرح زیر است:

• زخم‌های گوارشی

بزرگسالان: روزانه ۴۰ میلی‌گرم به مدت ۴ هفته، در صورت نیاز افزایش دوز به میزان ۸۰ میلی‌گرم در روز

• رژیم درمان هلیکوباکتریلوری

بزرگسالان: ۴۰ میلی‌گرم دوبار در روز به همراه داروهای دیگر درمان این بیماری

• ریفلکس گاستروازوفایت

بزرگسالان: روزانه ۲۰ تا ۸۰ میلی‌گرم به مدت ۴ هفته، اگر بهبود کامل حاصل نشود، می‌تواند چهار هفته ادامه یابد.

• سندروم زولینگر-الیسون

بزرگسالان: روزانه ۸۰ میلی‌گرم

• پیشگیری از زخم ناشی از مصرف NSAID

بزرگسالان: روزانه ۲۰ میلی‌گرم

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت نسبت به داروی پنتوسک یا یکی از اجزای تشکیل دهنده آن و نیز در صورت حساسیت به یکی از داروهای این دسته (مهارکننده پمپ پروتون) از مصرف این دارو خودداری کنید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی در زمینه عوارض این دارو بر جنین انسان انجام نشده لذا مصرف آن در طول بارداری باید حتماً تحت نظر پزشک معالج انجام شود.

میزان ترشح این دارو در شیر نامشخص است و به علت احتمال عوارض جدی بر نوزاد، مصرف آن در شیردهی توصیه نمی‌شود.

هشدارها و احتیاطات:

در صورت مصرف وارفارین، INR بیمار باید پایش شود.

در صورت مصرف طولانی مدت این دارو (روزانه به مدت بیش از سه سال) ممکن است کمبود ویتامین B_{۱۲} ایجاد شود.

در صورت برطرف نشدن عوارض زیر به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

اسهال، درد پشت، سرفه، سردرد، گیجی، اضطراب

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از داروهای زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

رزیدپرونیت، مزالازین، کتوکونازول، ایتراکانازول، وارفارین، کلوییدوگرل، سالیسیلات‌ها، آمی‌سیلین، نمک‌های آهن، دیگوسین، ویتامین B_{۱۲}، اریوتینیب

عوارض جانبی:

عوارض با احتمال بیشتر شامل دل درد، نفخ، تهوع، استفراغ، یبوست، سردرد، اسهال

عوارض با احتمال کمتر شامل خشکی دهان، درد عضلانی، درد مفاصل، گیجی، خستگی، راش، افزایش چربی خون، گرگز دست و پا، افزایش وزن، افزایش ALT

شرایط نگهداری دارو:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

تاریخ آخرین بازمینی: خرداد ماه ۱۳۹۶

Ref:

1. USP DI2007, VOL 3, pages 2267- 2270

2. BNF 70 2016, pages 62,67

3. Drug FACT & comparisons 2010, VOL 2, Page: 1810,1811,1818

www.aryapharm.com

info@aryapharm.com

تولید شده در شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص)

۴۴۹۸۱۰۸۱ - ۳

ایران - تهران



Pantosec[®] 20 & 40

Pantoprazole 20 & 40 mg Enteric Coated Tablets

Drug Properties:

Enteric coated tablet contains 20 or 40mg pantoprazole (as sodium sesquihydrate)

Administration:

Swallow whole, tablet do not crush or chew, it best if taken before breakfast.

Indication & Dosage:

This is an gastrointestinal drug in proton pump inhibitors category.

Your physician determine your drug dosage. usual dosages are as below:

- Peptic ulcer

Adult: 40 mg daily for 4 weeks, increased if necessary up to 80 mg daily

- H.Pylori

Adult: 40 mg twice daily

- Gastroesophageal reflux disease (GERD)

Adult: 20–80 mg daily for 4 weeks, continued for further 4 weeks if not completely healed

- Zollinger-Ellison syndrome

Adult: Initially 80 mg daily

- Prevention of GI lesions associated with NSAID use

Adult: 20 mg daily

Contraindications:

Hypersensitivity to any component of the formulation

Hypersensitivity to other proton pump inhibitors

Pregnancy and lactation:

there are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Use during pregnancy only under supervision of your physician.

It's not recommended, because serious adverse reactions may occur in nursing infants.

Warning & Precautions:

In patients who use warfarin, INR should be monitored.

In patients who use Pantosec[®] for long time (daily for more than three years) vitamin B12 deficiency can be occurred.

If these side effects continue, contact your physician:

diarrhea, back pain, headache, dizziness, cough, anxiety

Drug Interactions:

Risedronate, mesalazine, ketoconazole, itraconazole, Warfarin, Clopidogrel, Salicylates, ampicillin, iron salts, digoxin, cyanocobalamin, Erolitinib

Side Effects:

Common: Headache, abdominal pain, flatulence, nausea, vomiting, constipation, diarrhea

Uncommon: dry mouth, arthralgia, dizziness, fatigue, paresthesia, rash, hyperlipidemia, weight gain, ALT increased.

Storage Condition:

Store in dry, cool place (Below 30°C) & away from light.

Ref:

1. USP DI2007, VOL 3, pages 2267- 2270

2. BNF 70 2016, pages 62,67

3. Drug FACT & comparisons 2010, VOL 2, Page: 1810,1811,1818

Date of Revisio: June 2017

Manufactured by ARYA Pharmaceutical Co.

Tehran - Iran (+9821) 44 98 10 81 - 3

www.aryapharm.com

info@aryapharm.com

