

مشخصات دارو:

ریواستیگمین یک داروی مهارکننده آنزیم کولین استراز است که در درمان فراموشی خفیف تا متوسط در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این دارو در درمان فراموشی بیماران مبتلا به پارکینسون به کار می‌رود.

یادآوری:

- این دارو برای بیماری کتونی شما تجویز شده است، از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید، مصرف دارو را قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.
- داروها را به طور کلی از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

راهنمایی‌های عمومی:

- قبل از مصرف دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید:
- چنانچه نسبت به این دارو حساسیت دارید.
- چنانچه نسبت به انواع غذاها و افزودنی‌های آن‌ها مانند رنگ‌ها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.
- چنانچه باردار هستید و یا ممکن است باردار شوید و یا در دوران شیردهی به سر می‌برید.
- چنانچه از سایر داروها خصوصاً دیگر داروهای مهارکننده کولین استراز استفاده می‌نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در طول دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد و فواید مصرف دارو در برابر مضرات آن سنجیده شود.

احتیاطات:

- جهت انجام معاینات دوره‌ای به طور منظم به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
- در صورت کاهش وزن، تهوع و استفراغ شدید به پزشک خود اطلاع دهید.
- این دارو می‌تواند منجر به بروز مشکلات بی‌خوابی، خستگی، استرس، اضطراب، دوبینی و توهم شود. در صورت بروز به پزشک اطلاع دهید.
- در صورت عدم مصرف دارو به مدت چند روز متوالی از مصرف مجدد دارو بدون مشورت با پزشک پرهیزید.
- از مصرف هر نوع داروی دیگری خصوصاً داروهای مهارکننده کولین استراز بدون مشورت با پزشک خود پرهیز نمایید.
- از مصرف همزمان دارو با داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی پرهیزید زیرا باعث افزایش اسید معده و تحریک دستگاه گوارش می‌شود.

• در صورت بروز علائم اکستراپیرامیدال (نظیر لرزش دست) و یا افزایش شدت علائم به پزشک اطلاع دهید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک معالج شما تعیین می‌گردد و تبعیت از دستور پزشک معالج در مورد مقدار و نحوه مصرف آن الزامی است.

دوز معمول دارو در ابتدا ۱/۵ میلی‌گرم دوبار در روز می‌باشد. در صورت نیاز به افزایش دوز، حداقل پس از دو هفته از تجویز دارو، دوز دارو می‌تواند به ۳ میلی‌گرم دوبار، سپس به ۴/۵ و ۶ میلی‌گرم دوبار در روز افزایش یابد. در صورت بروز عوارض جانبی نظیر اسهال و استفراغ پس از قطع چند دوز، دارو با همان دوز کمتر مصرف شود. (فواصل زمانی در افزایش دوز حداقل ۲ هفته می‌باشد) در بیماران با مشکل پارکینسون دوز معمول دارو در ابتدا ۱/۵ میلی‌گرم دوبار در روز می‌باشد. در صورت نیاز به افزایش دوز، حداقل پس از چهار هفته از تجویز دارو، دوز دارو می‌تواند به ۳ میلی‌گرم ۴/۵ و ۶ میلی‌گرم دوبار در روز افزایش یابد. (توجه فرمایید که حداکثر دوز مصرفی ۶ میلی‌گرم دوبار در روز می‌باشد)

عوارض جانبی:

همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی ممکن است عوارض ناخواسته‌ای بروز نماید. در صورت بروز هر یک از عوارض ذیل به پزشک خود اطلاع دهید:
خستگی، بی‌خوابی، سردرد، لرزش، مشکلات گوارشی، اضطراب، کاهش وزن.

شرایط نگهداری:

- از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

REF: BNF70 - September 2015 - March 2016, Page 264 - 265

USP DI 2007, Vol3, Page 2551 - 2554

Drug Fact and Comparisons 2010, Vol2, Page 1475 - 1478

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی برگه راهنما: ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵



www.aryapharm.com

info@aryapharm.com

تولید شده در شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص)

ایران - تهران ۳ - ۸۱ ۰۸۱ ۴۴۹۸