

**یادآوری :**

از مصرف بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک و یا توصیه شده در بروشور دارو خودداری نمایید.

چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک خود تماس بگیرید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

**الف – راهنمایی های عمومی :**

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید.

چنانچه قبلاً نسبت به این دارو یا هر یک از داروهای استامینوفن ، پروفن یا کافئین حساسیت داشته اید.

چنانچه سابقه بیماری کلیوی شدید یا کبدی دارید.

چنانچه حامله هستید یا در دوران شیردهی به سر می برید.

چنانچه داروهای دیگری نیز مصرف می کنید.

**ب – مصرف در شیردهی :**

هنگام بارداری و شیردهی فواید دارو بایستی در برابر مضرات احتمالی آن سنجیده شود.

**پ – احتیاطات :**

در صورت مصرف هم زمان هر داروی دیگری از جمله داروهای ضد التهاب، ضد انعقاد، داروهای محرک مغزی، مهار کننده های مونوآمینواکسیداز و یا سایر داروها با پزشک خود مشورت نمایید.

از مصرف نوشابه های الکلی پرهیز نمایید.

این دارو ممکن است در نتایج پاره ای از آزمایشات تشخیصی طبی ایجاد تداخل نماید.

**ت – مقدار و نحوه مصرف :**

دوز معمول مصرف این دارو ۱ تا ۲ کپسول طی روز می باشد. تبعیت از دستورات

پزشک معالج در مورد تعداد و نحوه مصرف بیشتر از این مقدار این دارو الزامی است.

### ث - عوارض جانبی :

همراه با اثرات درمانی این دارو ممکن است عوارض ناخواسته ای بروز نماید. اگرچه همیشه و یا همه عوارض گفته شده ممکن است در یک فرد ظاهر نشود ، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید. تب همراه یا بدون لرز ، بثورات دهان و لب ها ، خارش ، زردی چشم ، خستگی مفرط ، کاهش ناگهانی حجم ادرار و بروز هرگونه خونریزی غیر معمول ، خون در ادرار یا مدفوع.

### ج - مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد لازم فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

### چ - شرایط نگهداری :

دارو را دور از نور مستقیم و حرارت نگهداری نمایید. از دسترس اطفال دور نگهدارید. در حمام ، نزدیک ظرفشویی آشپزخانه و یا سایر نقاط مرطوب قرار ندهید. داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.

