

Ticlopidine Arya

تیکلوپیدین آریا

Ticlopidine HCl 250 mg

تیکلوپیدین هیدروکلراید ۲۵۰ میلی گرم

این دارو به منظور کاهش احتمال بروز سکته قلبی در بیماران قلبی که قادر به تحمل آسپرین نیستند مصرف می شود.

یادآوری:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
- کلیه داروها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید، با پزشک خود تماس بگیرید.

راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید:
- سابقه واکنش های آلرژیک نسبت به داروها.
- در صورت استفاده از داروهای بدون نسخه (OTC) و داروهای نسخه ای به ویژه داروهای ضد انعقاد خون، آسپرین و هپارین.
- در صورت سابقه مشکلات انعقادی خون، بیماری خون، کلیه و زخم معده و نیز چنانچه در دوران بارداری یا شیردهی به سر می برید.

احتیاطات:

- حداقل در طول سه ماهه اول درمان با دارو، هر دو هفته یک بار آزمایش های خون را با راهنمایی پزشک خود انجام دهید تا در صورت بروز هر نوع عارضه جانبی، در جهت پیشگیری از پیشرفت آن اقدام گردد.
- در طول مصرف دارو، استفاده از آن را به اطلاع پزشک و دندانپزشک خود برسانید زیرا به دلیل امکان بروز خونریزی های جدی حین اعمال جراحی، دندانپزشکی و سایر فعالیت های درمانی ممکن است مجبور به قطع مصرف دارو به طور موقت باشید.
- در صورت وقوع هر نوع آسیب دیدگی و جراحی در طول مصرف دارو، فوراً با پزشک خویش تماس بگیرید.
- در مورد انواع فعالیت هایی که در طول مصرف دارو بایستی از آن ها پرهیز کنید با پزشک خویش مشورت نمایید.
- در صورت بروز خونریزی به ویژه خونریزی هایی که متوقف نمی گردند، هر نوع نشانه عفونت از قبیل تب، لرز یا گلو درد و در صورت بروز لکه های سفید و یا زخم در دهان بلافاصله پزشک خویش را مطلع سازید.
- پس از قطع مصرف دارو، امکان ادامه خونریزی ۱ تا ۲ هفته باقی خواهد ماند، لذا در این دوران نیز احتیاطات فوق را مد نظر داشته باشید.

مقدار و نحوه مصرف:

- این دارو را دقیقاً به شیوه ای که پزشک به شما دستور داده است استفاده نمایید. مصرف مقادیر

کمتر از مقدار توصیه شده اثر درمانی مطلوبی ایجاد نخواهد کرد، مصرف مقادیر بیشتر از مقدار توصیه شده نیز امکان بروز خونریزی و یا دیگر مشکلات جدی را بدون افزایش اثرات مفید بیشتر خواهد کرد.

• دارو را به همراه غذا میل نمایید زیرا موجب افزایش جذب دارو می‌گردد و شانس بروز عوارض معده‌ای را کاهش می‌دهد.

در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن، آن را میل کنید و چنانچه تا دوز بعدی زمان چندانی باقی نمانده بود دوز فراموش شده را حذف کنید و طبق زمان‌بندی اولیه داروی خویش را میل نمایید و دوز بعدی را دو برابر نسازید.

عوارض جانبی:

به طور کلی تمامی داروها همراه با اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگرچه همیشه و یا تمام عوارض ذکر شده در یک بیمار رخ نخواهد داد لکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید:

• عوارض نادر:

درد شدید شکم و معده، درد پشت، قرمزی شدید چشم، ظهور خون در ادرار و مدفوع (سیاه شدن مدفوع)، گیجی، تب، لرز، گلو درد، سردرد شدید، استفراغ خونی، خونریزی شدید از محل زخم یا بریدگی، خونریزی‌های شدید و غیر قابل انتظار در قاعدگی.

• عوارض شایع تر: راش پوستی.

عوارضی که در صورت بروز نیاز به توجه پزشکی ندارند ولی در صورت تداوم لازم است با پزشک خویش تماس بگیرید.
درد خفیف شکم و معده، تهوع و استفراغ.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد لازم، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

شرایط نگهداری:

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- دور از حرارت و نور مستقیم باشد.
- در حمام، نزدیک ظرفشویی آشپزخانه و یا سایر نقاط مرطوب قرار نگیرد.
- دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و الزاماً در ظرف کاملاً بسته نگهداری گردد.

