

قرصی توپیرامات (۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی)

توپیرامات دارویی است که برای کنترل حملات تشنجی در درمان صرع بکار می رود.
یادآوری:

- این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دارو را کاملاً مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید، مصرف دارو را قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو نیز پرهیز نمایید.
- داروها را بطور کلی دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- چنانچه سؤال یا نکته مبهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

الف - راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک معالج خود رسانیده و با او مشورت نمایید:
- چنانچه نسبت به این دارو، انواع غذاها و افزودنیهای آنها مانند رنگ ها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.
- چنانچه سابقه بیماری کلیوی، کبدی و یا سنگ کلیه دارید.
- چنانچه حامله هستید یا ممکن است حامله شوید و یا در دوران شیردهی به سر می برید.
- چنانچه هر نوع داروی دیگر بخصوص داروهای ضد صرع، ضد بارداری و دیورتیک مصرف می نمایید.

ب - مصرف در بارداری و شیردهی:

- در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری مطالعات خاصی بر روی انسان انجام نشده است و مصرف دارو بایستی در برابر مضرات آن سنجیده شود.
- مصرف این دارو در دوران شیردهی مجاز نمی باشد.

پ - احتیاطات:

- این دارو را فقط طبق دستور پزشک و دقیقاً مطابق مقدار و مدت زمان توصیه شده مصرف نمایید.
- از خرد کردن و یا جویدن این دارو به علت طعم تلخ آن خودداری نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است در بعضی افراد سبب تاری دید، سرگیجه، خواب آلودگی و اشکال در تفکر شود، از این رو پیش از پرداختن به اموری نظیر رانندگی یا کار با وسایل و یا دستگاه هایی که نیاز به هوشیاری دارند از عکس العمل خود نسبت به این دارو آگاه شوید.
- در صورت مصرف توأم داروهای ضد بارداری حاوی استروژن با این دارو، امکان ایجاد حاملگی ناخواسته به علت کاهش شدید اثر داروی ضد بارداری وجود دارد. در این حالت از روشهای جایگزین جلوگیری از بارداری استفاده نمایید.
- در طول درمان با این دارو، جهت پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه، مایعات فراوان بنوشید.
- در صورت مصرف داروهای نظیر استازولامید و سایر دیورتیک ها، کاربامازپین،

داروهای ضد بارداری حاوی استروژن، فنی تونین و والپروئیک اسید که با توپیرامات تداخل اثر دارویی دارند، با پزشک خود مشورت نمایید.

ت - مقدار و نحوه مصرف :

• مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک معالج شما تعیین می گردد و تبعیت از دستورات پزشک معالج در مورد مقدار و نحوه مصرف این دارو الزامی است.

اطلاعاتی که ذیلاً ارائه می گردد حدود دوز درمانی این دارو را بیان می دارد.

• بزرگسالان : مقدار مصرف معمول این دارو از ۵۰ میلی گرم در روز آغاز شده و بنا بر تشخیص پزشک معالج تا ۴۰۰ میلی گرم در روز قابل افزایش است.

• کودکان : نحوه مصرف و دوز دارو توسط پزشک معالج تعیین می گردد.

• چنانچه یک نوبت مصرف این دارو را فراموش نمودید، به محض یادآوری آن را میل نمایید و در صورتیکه نزدیک نوبت مصرف بعدی دارو بود دوز فراموش شده را میل نکنید و دوزهای بعدی را نیز دو برابر نسازید.

ث - عوارض جانبی :

• همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی عوارض ناخواسته ای بروز می نماید. اگرچه این عوارض ممکن است در یک فرد ظاهر نشود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید:

• عوارض شایع تر : احساس گرمی و سوزش، لرزش، سرگیجه، حرکات چرخشی غیر قابل کنترل چشم، دوبینی یا سایر اختلالات بینایی، خواب آلودگی، کاهش عمومی فعالیت فکری و جسمی، کم شدن حافظه، اختلالات قاعدگی، حالات عصبی، اشکال در تکلم و تمرکز، خستگی و ضعف غیرعادی.

• عوارض کمتر شایع : درد شکم، تب، لرز یا گلو درد، کاهش قوه ادراک و احساس، کاهش اشتها، تغییرات رفتاری و فکری نظیر پرخاشگری، نا آرامی، بی تفاوتی، تحریک ناپذیری و افسردگی، قرمزی، التهاب و خونریزی لثه ها، کاهش وزن.

• عوارض نادر : وجود خون در ادرار، بی میلی و ناتوانی جنسی، اختلالات ادراری یا تکرر ادرار، کاهش شنوایی، خارش، درد پهلو و پشت، خونریزی از بینی، رنگ پریدگی، قرمزی و التهاب چشم، احساس صدا در گوش، راش های پوستی، تورم و تنگی نفس.

• عوارض شایع تر : درد سینه در زنان، تهوع و لرزش.

• عوارض نادر : درد پشت، درد قفسه سینه، بیبوست، نفخ و سوزش معده، گر گرفتگی، افزایش تعرق، درد پا.

• این دارو می تواند باعث تغییر در حس چشایی شود.

در صورت بروز هر عارضه دیگری غیر از عوارض ذکر شده فوق، پزشک خود را در جریان قرار دهید.

ج - شرایط نگهداری :

• از دسترس اطفال دور نگهدارید.

• دارو را دور از نور مستقیم و حرارت نگهداری نمایید.

• در حمام، نزدیک ظرفشویی آشپزخانه و یا سایر نقاط مرطوب قرار ندهید.

• داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.

• از نگهداری دارو در یخچال یا فریزر خودداری کنید.

