

Film Coated Tablet

Bismuthan®

Bismuth Subcitrate

قرص روکش دار

بیسموتان®

بیسموت ساب سیترات

هر قرص روکش دار بیسموتان® حاوی ماده موثره بیسموت ساب سیترات برابر ۱۲۰ میلی گرم اکسید بیسموت می باشد. این محصول در جعبه های ۴۰ عددی عرضه می شود و هر جعبه حاوی ۴ بلیستر ۱۰ عددی می باشد. قرص بیسموتان® برای درمان زخم های معده و روده و عفونت های گوارشی ناشی از هلیکوباکتر پیلوری تجویز می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید. – چنانچه سابقه و یا بیماری فعلی کلیوی دارید. – چنانچه داروی دیگری مصرف می کنید. – چنانچه رژیم غذایی مخصوصی دارید و یا نسبت به مواد افزودنی حساسیت دارید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید با احتیاط بیشتر مصرف شود.

احتیاطات:

سایر فرآورده های بیسموت را همراه این دارو مصرف نکنید در صورت عدم بهبودی و یا تشدید علائم بیماری به پزشک خود مراجعه نمایید. در دوره درمان از مصرف خوردنی ها و آشامیدنی هایی که باعث تحریک معده می شوند خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

– در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید. – مصرف هم زمان قرص بیسموتان® با داروهای تتراسایکلین و داکسی سایکلین ممکن است موجب کاهش جذب این داروها شود، در صورت نیاز به تجویز هم زمان باید حداقل با فاصله یک ساعت از هم مصرف شوند.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و نحوه مصرف دارو را پزشک معالج شما تعیین می کند. مقدار مصرف معمول قرص

بیسموتان[®] ۴ قرص در روز به صورت دو قرص نیم ساعت قبل از صبحانه و دو قرص موقع خواب و یا ۴ قرص در روز به صورت یک قرص نیم ساعت قبل از هر وعده غذا و یک قرص موقع خواب می‌باشد. چنانچه یک نوبت خوردن این دارو را فراموش کردید هر چه زودتر آن را میل کنید ولی چنانچه نوبت بعدی مصرف دارو نزدیک باشد از مصرف قرص فراموش شده خودداری کرده، نوبت بعدی را مطابق دستور مصرف میل نمایید.

قرص‌های بیسموتان[®] را نیم ساعت قبل از غذا و موقع خواب در حالی که معده خالی می‌باشد میل نمایید.

دوره درمان معمول این دارو ۴ تا ۸ هفته بر حسب تجویز پزشک معالج می‌باشد. در صورت لزوم ادامه درمان بعد از یک دوره قطع دارو به مدت ۸ هفته مجدداً توسط پزشک معالج تجویز می‌شود.

عوارض جانبی:

همراه با اثرات درمانی یک دارو ممکن است عوارض ناخواسته‌ای نیز بروز کند، اگر چه همیشه و یا همه عوارض گفته شده ممکن است در یک فرد ظاهر نشود، لیکن در صورت بروز هر عارضه‌ای به پزشک خود مراجعه نمایید.

عوارضی که به ندرت پیش می‌آید و بعد از اتمام دوره درمان از بین می‌روند عبارتند از:
تیره رنگ شدن زبان، سیاه شدن مدفوع، تهوع و استفراغ.
بروز عوارض جانبی در بیماران مسن محتمل‌تر است.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی برگه راهنما: ۱۳۹۷/۱/۲۷

Ref:

USP DI 2007, Vol 1. (P. 579), www.drugs.com

www.aryapharm.com

info@aryapharm.com

تولید شده در شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص)

ایران - تهران ۳ - ۸۱ ۱۰ ۴۴۹۸

