

قرص کلاریترومایسین آریا ۲۵۰ میلی گرمی

کلاریترومایسین یک داروی آنتی باکتریال از دسته ماکرولیدها می باشد. این دارو با اتصال به ساب یونیت 50S ریبوزومی میکروارگانیسم از سنتز پروتئین در باکتری جلوگیری می کند. کلاریترومایسین در درمان بسیاری از بیماریهای عفونی نظیر برونشیت، اوتیت، فارنژیت، پنومونی، عفونت های پوستی و بیماریهای ناشی از هلیکوباکتریلوری و مایکوباکتریوم آووم به کار می رود.

یاد آوری:

- این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید، مصرف دارو را قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.
- چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظر تان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید:
- چنانچه نسبت به این دارو و سایر داروهای دسته ماکرولیدها نظیر اریترومایسین حساسیت دارید.
- چنانچه نسبت به انواع غذاها و افزودنی های آنها مانند رنگ ها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.
- چنانچه حامله هستید یا ممکن است حامله شوید یا در دوران شیردهی به سر می برید.
- چنانچه هر نوع داروی دیگری مصرف می نمایند.
- چنانچه مبتلا به بیماریهای قلبی عروقی، کبدی، کلیوی و دستگاه گوارش می باشید.

مصرف در بارداری و شیر دهی:

مصرف کلاریترومایسین در طول دوران بارداری و شیر دهی باید تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد و فواید آن در برابر مضرات آن سنجیده شود.

احتیاطات:

- دارو را فقط طبق دستور پزشک و دقیقاً مطابق مقدار و مدت زمان توصیه شده مصرف نمایید.
- در صورت عدم بهبودی و یا تشدید علائم بیماری به پزشک خود مراجعه نمایید.
- در صورت بروز علائم واکنش های حساسیتی (قرمزی و خارش پوست)

و بروز علائم کولیت سودوممبران (دردهای شکمی، اسهال آبکی و گاهی همراه با خون) پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک معالج شما تعیین می گردد و تبعیت از دستور پزشک معالج در مورد مقدار و نحوه مصرف آن الزامی است.

اطلاعاتی که در ذیل ارائه میگردد حدود دوز درمانی دارو را بیان میدارد: در بالغین، کلاریترومایسین به صورت خوراکی به میزان ۲۵۰ میلی گرم دو بار در روز تجویز می شود. با توجه به نوع و میزان عفونت، دوز دارومی تواند به ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز افزایش یابد. دوره درمان بسته به نوع بیماری ۷-۱۴ روز می باشد. در کودکان کلاریترومایسین به میزان ۷/۵ میلی گرم در هر کیلوگرم، دو بار در روز تجویز می شود. دوره درمان بسته به نوع بیماری ۵-۱۰ روز می باشد.

به منظور درمان بیماریهای ناشی از هلیکوباکتریلوری کلاریترومایسین با دوز ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز همراه با دیگر داروهای آنتی باکتریال و مهار کننده های پمپ های پروتونی تجویز می شود.

عوارض جانبی:

همراه با اثرات درمانی یک داروگاهی ممکن است عوارض ناخواسته ای بروز نماید.

در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید:

سمیت کبدی (زرد شدن رنگ چشم و پوست، تهوع، استفراغ) واکنش های حساسیتی (قرمزی و خارش پوست) کولیت سودوممبران (دردهای شکمی، اسهال آبکی و گاهی همراه با خون) ترومبوسیتونی (خونریزی های غیر معمول) در صورت برطرف نشدن عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید:

اختلالات در حس چشایی، نفخ، سر درد، درد معده.

از عوارض بسیار نادر کلاریترومایسین می توان به سندروم استیونس جانسون، کاهش قند خون، نوتروپنی، لوکوپنی، آریمی، تائیکاردی، احساس صدا در گوش، لرزش، سرگیجه اشاره نمود.

شرایط و نحوه نگهداری:

- دارو را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- دارو را در دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
- داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.

