

قرص از تیمایب آریا ۱۰ میلی گرمی

از تیمایب از دسته داروهای پایین آورنده چربی خون می باشد. این دارو به تنهایی و یا همراه با داروهای مهارکننده ApoB و LDL-C و HMG-CoA reductase به دلیل ایجاد کاهش در درمان بیماران با هایپرکلسترملی اولیه بکار می رود.

یاد آوری

- این دارو برای بیماری کتوننی شما تجویز شده است از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- دارو را طبق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید. حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید مصرف دارو را قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

- چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظر تان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید:
- چنانچه نسبت به هریک از داروهای مهارکننده اسید معده و سایر مواد حساسیت دارید.
- چنانچه مبتلا به ناراحتی حاد کبدی میباشید.
- چنانچه حامله هستید یا ممکن است حامله شوید یا در دوران شیردهی به سر میرید.

مصرف در بارداری و شیر دهی :

منافع مصرف دارو باید در برابر مضار آن سنجیده شود. مصرف از تیمایب در دوران بارداری باید با احتیاط و تحت نظر پزشک صورت گیرد.

مصرف در شیردهی باید طبق دستور پزشک صورت گیرد.

احتیاط :

- در صورت مصرف همزمان از تیمایب با داروهای دیگر بخصوص کلتیرامین، سیکلوسپورین، فنوفیرات، جفمفیروزیل، مهارکننده های HMG-CoA reductase با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی، اختلال در ترنس آمیناز های سرمی با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
- در صورت مصرف مهارکننده های HMG-CoA reductase

با از تیمایب بیمار باید جهت پیگیری سلامت کبد مورد آزمایش قرار گیرد.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک معالج شما معین میگردد و تبعیت از دستور پزشک معالج در مورد مقدار و نحوه مصرف این دارو الزامی است. اطلاعاتی که در ذیل ارائه میگردد حدود دوز درمانی دارو را بیان میدارد :

دوز درمانی ۱۰ میلی گرم در روز همراه یا بدون غذا میل نمایید. تجویز دارو در کودکان زیر ۱۰ سال توصیه نمیشود. در صورت فراموش کردن مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را میل نمایید.

عوارض جانبی :

همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی عوارض ناخواسته ای بروز مینماید. اگرچه این عوارض ممکن است در یک فرد ظاهر نشود. در صورت مشاهده عوارض جانبی ذیل فوراً به پزشک معالج خود مراجعه نمایید:

- واکنش های حساسیتی مانند آنژیوادم و راشهای پوستی.
در صورت مشاهده عوارض جانبی ذیل به مدت طولانی فوراً به پزشک معالج خود مراجعه نمایید:
- دردهای شکمی، دردهای عضلانی و اختلال حرکتی، درد پشت یا قفسه سینه، سرفه، اسهال، گبجی، عفونت های ویروسی.

مسمومیت :

در صورت بروز مسمومیت فوراً به پزشک مراجعه نمایید. درمان مسمومیت : درمان حمایتی و علامتی صورت میگیرد.

شرایط و نحوه نگهداری :

- از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- دارو را از نور مستقیم و در دمای بین ۳۰ - ۱۵ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
- در حمام، نزدیک ظرفشویی و سایر نقاط مرطوب قرار ندهید.
- دارو های تاریخ گذشته را دور بریزید.



شرکت داروسازی آریا

(مهاجمی خاص)