

کپسول اورلیستات آریا ۱۲۰

اورلیستات یک داروی مهار کننده آنزیم لیپاز است که با جلوگیری از جذب چربیهای خوراکی می‌تواند در درمان چاقی موثر باشد. همچنین از این دارو می‌توان پس از کاهش وزن، زمانیکه فرد ببروی رژیم کم کالری قرار می‌گیرد، به منظور جلوگیری از افزایش وزن استفاده نمود.

یاد آوری :

- این دارو برای بیماری کنونی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمائید.

- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید، مصرف دارو را قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

- داروها را به طور کلی از دسترس اطفال دور نگه دارید.

- چنانچه سوال یا نکته مهمی به نظرتان رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمایید :

- چنانچه نسبت به این دارو حساسیت دارید.

- چنانچه نسبت به انواع غذاها و افزودنی های آنها مانند رنگ ها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.

- چنانچه حامله هستید و یا ممکن است حامله شوید و یا در دوران شیردهی به سر می برید.

- چنانچه ساقیه بیماری تیروئید و کبدی را دارید.

- چنانچه از سایر داروها خصوصاً لووتیروکسین، دیگوکسین و وارفارین استفاده می نمایید.

صرف در بارداری و شیردهی :

صرف این دارو در طول دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد و فواید

صرف دارو در برابر مضرات آن سنجیده شود. در صورت مصرف دارو در دوران شیردهی می باشیستی روش جایگزینی در تعذیه نوزاد به کار رود.

احتیاطات :

- جهت انجام معاینات دوره ای به طور منظم به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.

- در ضمن مصرف این دارو یک بار در روز حداقل ۲ ساعت قبل یا بعد از مصرف اورلیستات ازویتامین های محلول در چربی استفاده نمایید.

- در صورت مصرف لووتیروکسین، با فاصله زمانی ۴ ساعت از اورلیستات آن را مصرف نمایید.

- مصرف این دارو در بیماران با مشکل دیابت با احتیاط صورت گیرد.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و شیوه مصرف این دارو توسط پزشک معالج شما تعیین می گردد و تبعیت از دستور پزشک معالج در مورد مقدار و نحوه مصرف آن الزامی است.

دوز معمول دارو یک کپسول ۱۲۰ میلی گرمی سه بار در روز همراه با وعده غذایی حاوی چربی می باشد.

عواوض جانبی :

همراه با اثرات درمانی یک دارو گاهی ممکن است عوارض ناخواسته ای بروز نماید. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید :

اختلالات گوارشی، درد شکمی، استفراغ، درد مفاصل، سردرد، گیجی، کمبود ویتامین.

شرایط و نحوه نگهداری :

- از دسترس اطفال دور نگهدارید.

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

- داروهای تاریخ گذشته را دور ببریزید.

