



قرص خط دار کلونازپام آریا ۲

کلونازپام ۲ میلی گرم

مشخصات دارو:

قرص خط دار کلونازپام آریا ۲ قرصهای سفید رنگ می باشد و حاوی ۲ میلی گرم کلونازپام است. این دارو در بلیستر ۱۰ عددی در دافل جعبه های مقوایی حاوی ده بلیستر ده عددی بسته بندی می گردد.

موارد مصرف دارو:

کلونازپام یک دارو از دسته بنزو دیازپین ها می باشد که در درمان اختلالات پانیک و اختلالات مشخص تشنجی نظیر صرع مورد استفاده قرار می گیرد.

(REF: USP DI 2007 Vol.1 Page 513,523)

راهنماییهای عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.
- این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند اجتناب کنید.
- چنانچه سوء مصرف الکل یا دارو، بیماری مغزی، اشکال در بلع، بیماریهای ریوی، کبدی یا کلیوی، گلوکوم، هایپراکتیویته، دپرسیون، میاستنی گراویس، پورفیری، تنگی نفس موقع خواب، صرع یا سابقه تشنج دارید به اطلاع پزشک خود رسانیده و با او مشورت نمائید.

(REF: USP DI 2007 Vol.1 Page 519)



موارد منع مصرف:

چنانچه نسبت به بنزودیازپین ها، انواع غذاها و افزودنیهای آنها مانند رنگها و مواد نگهدارنده حساسیت دارید.

(REF: USP DI 2007 Vol.1 Page 519)

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی مجاز نمی باشد.

(REF: USP DI 2007 Vol.1 Page 515,516)

هشدارها:

در افراد حساس و آسماتیک با احتیاط مصرف شود.

(REF: USP DI 2007 Vol.1 Page 520)

احتیاطات:

- دارو را فقط طبق دستور پزشک و دقیقاً مطابق مقدار و مدت زمان توصیه شده مصرف نمایید.
- جهت انجام معاینات دوره ای به طور منظم به پزشک معالج خود مراجعه نمایید. در صورتیکه این دارو را برای درمان حالات تشنجی استفاده می کنید رعایت این امر در ماههای اول درمان حائز اهمیت می باشد.
- در صورتیکه این دارو را با دوز بالا یا برای مدت طولانی مصرف نموده اید به طور ناگهانی مصرف آن راقطع نکنید. جهت قطع نمودن تدریجی مصرف دارو به پزشک خود مراجعه کنید.
- اثرات این دارو بدنبال مصرف الکل و داروهای تضعف سیستم اعصاب مرکزی نظیر آنتی هیستامینها، داروهای سرماخوردگی، ضد اضطرابها، آرام بخشها، خواب آورها، نارکوتیکها، باریتوراتها، ضد تشنج ها، شل کننده های عضلانی یا داروهای بی حس کننده تشدید می شود. بنابراین قبل از مصرف هر یک از داروهای فوق باپزشک خود مشورت نمایید و از مصرف الکل اکیداً پرهیزید.
- قبل از انجام هر نوع آزمایشات پزشکی، پزشک معالج را از مصرف این دارو آگاه نمایید.
- هر نوع افکار یا رفتار عجیب و غیر معمول را در طول مصرف این دارو به اطلاع پزشک خود برسانید.



- تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و یا سایر امور نیازمند به هوشیاری پرهیز نمائید.

(REF: USP DI 2007 Vol.1 Page 519,520)

تداخلات دارویی:

- در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.
- در صورت استفاده از سایر داروها خصوصاً کاربامازپین، داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی، آنتی اسید، سایمتیدین، استفاده میکنید حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

(REF: USP DI 2007 Vol.1 Page 517)

مقدار ونحوه صحیح مصرف دارو:

- جهت کنترل تشنج:
بزرگسالان: ابتدا ۰/۵ میلی گرم ۳ بار در روز. قابل افزایش تا حداکثر ۲۰ میلی گرم در روز بنابر تشخیص پزشک معالج.
- نوزادان و کودکان کمتر از ۱۰ سال: دوز دارو براساس وزن بدن و توسط پزشک معالج تعیین می شود.
- جهت کنترل اضطراب و اختلالات پانیک:
بزرگسالان: ابتدا ۰/۲۵ میلی گرم ۲ بار در روز قابل افزایش تا حدود ۴ میلی گرم در روز بنابر تشخیص پزشک معالج.
- کودکان: نحوه مصرف و دوز دارو توسط پزشک معالج تعیین می گردد.
- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش نمودید تا حدود یک ساعت پس از زمان مصرف می توانید آنرا میل نمائید، در غیر این صورت دوز فراموش شده را حذف نموده و دوز بعدی را نیز ۲ برابر نسازید.

(REF: USP DI 2007 Vol.1 Page 520,524)



عوارض جانبی:

- عوارض کمتر شایع: اضطراب، گیجی، تندی یا بی نظمی ضربان قلب، کم شدن حافظه، افسردگی.
- عوارض نادر: افکار غیر عادی، تغییرات رفتاری نظیر بد خلقی، تشنج، توهم، بیقراری، افت فشارخون، ضعف عضلانی، راشهای پوستی، گلودرد، تب ولرز، بی خوابی، زخم دهان یا گلو، حرکات غیر ارادی بدن و چشم، خونریزی یا کبودی غیر عادی، هیجان غیر عادی، حالات عصبی یا تحریک پذیری غیر معمول، خستگی و ضعف غیر عادی، زرد شدن چشم ها و پوست.
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

(REF: USP DI 2007 Vol.1 Page 518)

شرایط نگهداری دارو:

- دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
- تا موقع مصرف دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.
- دارو را از بسته بندی اصلی خود خارج نکنید.

(REF: USP DI 2007 Vol.1 Page 513,523)

نام، آدرس، تلفن، Email:

- کارخانه داروسازی آریا
- آدرس: کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج - خیابان داروپخش - کارخانه داروسازی آریا
- تلفن: ۳ - ۴۴۹۸۱۰۸۱

Email: aryapharma68@yahoo.com