

**مشخصات دارو:**

هر قرص روکش دار حاوی ۲۵ و یا ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین به عنوان ماده موثره می باشد، محصولات قرص سیتاگلیپتین ۲۵ و ۵۰ میلی گرم در جعبه های مقوایی حاوی سه بلیستر ۱۰ عددی بسته بندی و عرضه می گردد.

**موارد مصرف دارو:**

قرص سیتاگلیپتین ۲۵ و ۵۰ میلی گرمی از دسته دارویی مهارکننده دی پپتیدیل پپتیداز-۴ می باشد و به عنوان کاهنده قند خون در درمان دیابت ملیتوس نوع ۲ در بیماران بزرگسال مصرف می شود. این دارو باعث افزایش سطح انسولین تولید شده بعد از مصرف وعده غذایی و کاهش قند خون می گردد. این دارو می تواند به تنهایی و یا با ترکیب سایر داروهای پایین آورنده قندخون از قبیل انسولین، متفورمین، سولفونیل اوره ها، گلیتازون، که ممکن است هم اکنون از آن ها همراه با ورزش و رژیم غذایی برای بیماری دیابت خود استفاده می کنید مصرف شود.

**راهنمایی های عمومی برای بیمار:**

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

- چنانچه عوارض دارو با مشکلات جدی همراه بود و یا چنانچه عوارضی غیر از آنچه که در بروشور درج شده است، مشاهده نمودید با پزشک یا داروساز خود در میان بگذارید.
- در صورت حساسیت به سیتاگلیپتین و یا هر یک از اجزای این محصول، با پزشک خود مشورت نمایید.
- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید. حتی اگر در طول مصرف احساس بهمودی کردید مصرف دارو را به هیچ عنوان قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

**موارد منع مصرف:**

- سابقه حساسیت جدی نظیر آنافیلاکسی یا آنژیوداما به سیتاگلیپتین و یا سایر مواد به کار رفته در ترکیب دارو.
- اگر مبتلا به دیابت کتواسیدوز می باشید.

**هشدارها:**

- قبل از مصرف قرص سیتاگلیپتین ۲۵ یا ۵۰ میلی گرمی، در صورت وجود هریک از موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
- اگر دچار بیماری دیابت نوع ۱ می باشید.
  - چنانچه دارای سابقه نارسایی قلبی هستید.
  - چنانچه دچار سنگ های کیسه صفرا و یا اعتیاد به الکل و یا افزایش تری گلیسیرید خون هستید.
  - چنانچه دچار بیماری کلیوی هستید.
  - چنانچه دارای سابقه بیماری پانکراتیت هستید.
- اگر ضمن مصرف داروی سیتاگلیپتین علائم بیماری پانکراتیت (درد های شکمی شدید و مداوم) بروز نماید مصرف دارو را قطع نموده و به پزشک خود اطلاع دهید.
- این دارو از نظر مصرف در دوران بارداری در گروه B می باشد. چنانچه باردار هستید و یا در دوره شیردهی می باشید، قبل از مصرف سیتاگلیپتین با پزشک خود مشورت نمایید.

**احتیاطات:**

- قرص سیتاگلیپتین ۲۵ و ۵۰ میلی گرم می تواند همراه یا بدون غذا و مایعات مصرف گردد.
- کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال نباید این دارو را مصرف نمایند. ایمنی و اثر بخشی این دارو بر روی کودکان و نوجوانان ثابت نشده است.

• مصرف این دارو تأثیری در کار با ماشین آلات و یا رانندگی نخواهد داشت. با این حال سرگیجه و خواب آلودگی در اثر مصرف این دارو گزارش شده است که ممکن است بر روی توانایی شما در رانندگی و کار با ماشین آلات موثر باشد. در مورد مصرف همزمان این دارو با داروهای گروه سولفونیل اوره ها و انسولین که می تواند سبب هایپوگلیسمی شده و بر رانندگی و کار با ماشین آلات موثر باشد، با پزشک خود مشورت نمایید.

• رژیم غذایی و ورزش می تواند به بهتر مصرف شدن قند خون شما کمک کند. این مهم است که رژیم غذایی و انجام ورزش که توسط پزشک تعیین شده است، رعایت شود.

### تداخلات دارویی:

• تداخل سایر داروها با قرص سیتاگلیپتین ۲۵ و ۵۰ میلی گرم: دیگوسین (دارویی که برای درمان ضربان نامنظم قلب و دیگر مشکلات قلبی استفاده می شود). سطح دیگوسین در خون شما هنگامی که داروی سیتاگلیپتین مصرف می نمایید، ممکن است نیاز به کنترل داشته باشد.

### مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:  
• بزرگسالان: در دیابت ملیتوس نوع ۲، ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز. این دارو می تواند به صورت مجزا و یا همراه با سایر داروها مثل متفورمین مصرف گردد.

• سالمندان: به دلیل مواجه بودن بیماران سالمند با کاهش عملکرد کلیوی، مقدار مشخصی از دارو بایستی مصرف گردد. همچنین قبل و بعد از دوز مصرفی دارو می بایست عملکرد کلیه ارزیابی گردد.

• در بیماران با نقص عملکرد کلیه: طبق نظر پزشک معالج دوز دارو بر اساس عملکرد کلیه تنظیم می شود، ارزیابی عملکرد کلیه قبل و بعد از مصرف دارو به صورت دوره ای توصیه می گردد.

• مقدار دوز و دوره مصرف را افزایش ندهد و دستور پزشک را رعایت نماید.

• دارو را در فواصل زمانی منظم میل نماید.

• اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله پس از یادآوری آن را مصرف نمایید ولی چنانچه زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه داده و مقدار دوز بعدی را نیز دو برابر نکنید.

### عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:  
عوارض رایج: اختلالات گوارشی، نازوفارانژیت، درد، ادم محیطی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی.

عوارض با شیوع کمتر: بی اشتها، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان، سردرد، هایپوگلیسمی، استنواثریت (آزتروز).

عوارض نادر: واسکولیت پوستی، پانکراتیت، بثورات پوستی، سندرم استیون جانسون.

### مسمومیت:

• در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و مراکز درمانی مراجعه نمایید.

### شرایط نگهداری:

• دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

• دارو را از بسته بندی اصلی خود خارج نکنید.

• دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی برگه راهنما: ۱۳۹۷/۱۰/۸

### References:

Drug Facts and Comparisons 2017, v1, P. 475 - 477,

BNF73, P. 635, www.rxlist.com, www.ema.europa.eu

www.aryapharm.com

info@aryapharm.com

تولید شده در شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص)

ایران - تهران ۳ - ۸۱ - ۱۰۹۸ ۴۴

