

مشخصات دارو:

هر قرص روکش دار حاوی ۵ و یا ۱۰ میلی گرم سولیفناسین سوکسینات به عنوان ماده موثره می باشد، قرص های سولیفناسین ۵ و ۱۰ میلی گرم در جعبه های مقوایی حاوی سه بلیستر ۱۰ عددی بسته بندی و عرضه می گردد.

موارد مصرف دارو:

قرص سولیفناسین ۵ و ۱۰ میلی گرم جز دسته داروهای آنتی کولینرژیک می باشد. این دارو برای درمان علائم بیماری مثانه بیش فعال استفاده می گردد که این علائم شامل احساس شدید و ناخواسته ادرار بدون وجود علائم قبلی، تکرر ادرار، بی اختیاری ادرار می باشد.

راهنمای های عمومی برای بیمار:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

- چنانچه عوارض دارو با مشکلات جدی همراه بود و یا چنانچه عوارضی غیر از آنچه که در برگه راهنما درج شده است، مشاهده نمودید با پزشک یا داروساز خود در میان بگذارید.
- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید، حتی اگر در طول مصرف احساس بهبودی کردید مصرف دارو را به هیچ عنوان قطع نکنید و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

موارد منع مصرف:

- مصرف این دارو (به غیر از موارد خاص) در افرادی که مشکلات پزشکی زیر را دارند، ممنوع می باشد:
- حساسیت به سولیفناسین و یا سایر اجزای قرص
- اگر در تخلیه ادرار با مشکل مواجه هستید (دچار احتباس ادرار می باشید).
- اگر دچار احتباس محتویات معده هستید.
- اگر دچار گلوکوم زاویه بسته هستید و این بیماری تحت کنترل نمی باشد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- این دارو از نظر مصرف در دوران بارداری متعلق به گروه C می باشد، مطالعات کافی درباره مصرف در دوران بارداری و شیردهی و تاثیر آن در باروری انجام نشده است، لذا بهتر است در دوران بارداری و شیردهی مصرف نگردد، مگر اینکه منافع و مزیت استفاده آن بسیار بیشتر از خطرات آن باشد.

هشدارها:

- در موارد زیر قبل از مصرف دارو با پزشک معالج خود مشورت نمایید:
- انسداد مثانه
- چنانچه دچار کم تحرکی در سیستم گوارش (معده و روده) می باشید.
- اگر از نارسایی کلیه رنج می برید.
- اگر دچار بیماری نارسایی کبدی هستید.
- اگر دچار سندرم طولانی شدن QT هستید و یا از داروهایی که فاصله زمانی QT را افزایش می دهند استفاده می کنید.
- اگر برای بیماری گلوکوم زاویه بسته تحت درمان هستید.
- چنانچه مصرف دارو بدون اطلاع پزشک متوقف شود، باعث بازگشت علائم بیماری مثانه بیش فعال و یا وخیم تر شدن شدت بیماری می گردد. لذا اگر قصد عدم مصرف دارو را دارید حتما با پزشک خود مشورت نمایید.

احتیاطات:

- قرص سولیفناسین ۵ و ۱۰ میلی گرم می تواند همراه یا بدون غذا و همراه مایعات مصرف گردد.
- ایمنی و اثر بخشی این دارو در کودکان ثابت نشده است.
- مصرف این دارو ممکن است موجب تاری دید و گاهی اوقات خواب آلودگی و یا خستگی گردد، لذا چنانچه از بروز این عوارض جانبی رنج می برید، از رانندگی و کار با ماشین آلات خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

- داروهای زیر با داروی سولیفناسین دارای تداخل هستند و باید با پزشک خود درباره مصرف هم زمان این داروها مشورت نمایید:
- داروهای مهارکننده آنزیم **CYP3A4** از قبیل کتوکونازول
 - داروهای افزاینده فاصله زمانی **QT** از قبیل: کلاریترومایسین، اریترومایسین، لووفلوکسازین، موکسی فلوکسازین، سیتالوپرام، دیسوپیرامید، پروکائین آمید، کینیدین، سوتالول، کلرپرومازین، پیموزاید، تیوریدازین.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:
- دوز دارو در بزرگسالان: ۵ میلی گرم یک بار در روز می باشد که با نظر پزشک تا ۱۰ میلی گرم یک بار در روز قابل افزایش است.
- در بیماران با اختلالات کبدی و کلیوی، دوز دارو بر اساس وضعیت بیماری توسط پزشک معالج تنظیم می شود.
 - در بیمارانی که از داروهای مهارکننده آنزیم **CYP3A4** مانند کتوکونازول استفاده می کنند، نباید مقدار مصرف دارو از ۵ میلی گرم یک بار در روز بیشتر شود.
 - مقدار دوز و دوره مصرف را افزایش نداده و دستور پزشک را رعایت نمایید.
 - دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید.
 - اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله پس از یادآوری آن را مصرف نمایید ولی چنانچه زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه داده و مقدار بعدی را نیز دو برابر نکنید.

عوارض جانبی دارو:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
- عوارض رایج: یبوست، خشکی دهان.
- عوارض با شیوع کمتر: تاری دید، سرخه، افسردگی، سرگیجه، خشکی چشم، سوءهاضمه، تجمع مایعات در پاها، خستگی، فشارخون بالا، آنفولانزا، تهوع، التهاب گلو (فارنژیت)، احتباس ادرار، عفونت مجاری ادرار، درد فوقانی شکم، استفراغ.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری دارو:

- دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- دارو را از بسته بندی اصلی خود خارج نکنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

References:

Drug Facts and Comparisons 2017, Vol 2, Page 1262 - 1265,
(BNF74, Page 734), USP DI 2007, Vol 3, Page 2642 - 2644



www.aryapharm.com
info@aryapharm.com

تولید شده در شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص)

ایران - تهران ۳ - ۸۱ ۹۸ ۴۴