

Thynofen®

Acetaminophen 325, 500 mg

تاینوفن®

استامینوفن ۳۲۵ و ۵۰۰ میلی گرم

مشخصات دارو:

هر قرص حاوی ۳۲۵ و یا ۵۰۰ میلی گرم استامینوفن به عنوان ماده موثره دارویی می‌باشد.
قرص تاینوفن® ۳۲۵ در دو بسته‌بندی ۳۰ عددی و ۱۰۰ عددی به صورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی و ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی عرضه می‌گردد.
قرص تاینوفن® ۵۰۰ در جعبه‌های ۱۰۰ عددی به صورت ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی عرضه می‌شود.

موارد مصرف دارو:

تاینوفن® (استامینوفن)، دارویی مسکن و تب بر است که به طور گستردۀ مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاینوفن® به خوبی قابل تحمل بوده و مانند آسپرین عوارض جانبی زیادی ندارد و معمولاً برای درمان تب، سردرد، دردهای خفیف آرتروز، کمردرد، دردهای قاعده‌گی، دردهای عضلانی و دندان درد استفاده می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از توصیه آن به دیگران و از مصرف آن در موارد مشابه و مصرف بیش از حد جداً خودداری فرمایید.
- در صورتی که بیماری‌های کلیوی، کبدی و فنیل کتونوری دارید با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
- در صورت حساسیت به استامینوفن و یا سایر اجزای تشکیل دهنده قرص با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

منافع مصرف دارو باقیستی در برابر مضرات آن سنجیده شود، در صورت نیاز به مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

هشدارها:

- مصرف قرص تاینوفن® ۵۰۰ در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی‌گردد.
- قرص تاینوفن® ۳۲۵ در کودکان زیر ۲ سال با مشورت پزشک مصرف شود.
- از مصرف این دارو همراه با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری نمایید.

موارد منع مصرف و احتیاطات:

- در بیماران با مشکلات کبدی با احتیاط مصرف شود.
- اگر گلودرد شدید همراه با تب، سردرد، تهوع، بشورات جلدی و یا استفراغ بیش از ۲ روز ادامه پیدا کرد در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.
- در صورتی که پس از مصرف این دارو، درد پس از گذشت ۱۰ روز در بزرگسالان و ۵ روز در کودکان و تب پس از گذشت ۳ روز بهمود نیافت و یا بدتر شد و علایم جدیدی هم مشاهده گردید، مصرف دارو را متوقف کرده و با پزشک خود تماس بگیرید.
- از مصرف نوشابه‌های الکلی پرهیز نمایید زیرا باعث افزایش عوارض جانبی پاراستامول می‌شود.

تداخلات دارویی:

- در صورت مصرف هم زمان این دارو با سایر داروها از جمله داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، آسپرین و

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو در هر بیمار را پزشک تعیین می‌کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

مقدار مصرف دارو در بزرگسالان و کودکان بالسن بیشتر از ۱۲ سال:

• ۳۲۵ تا ۶۵۰ میلی‌گرم هر ۴ تا ۶ ساعت.

• مقدار حداقل مجاز مصرف دارو ۴ گرم در ۲۴ ساعت می‌باشد.

مقدار مصرف دارو در کودکان ۶ تا ۱۲ سال:

• ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۴ تا ۶ ساعت مطابق با دستور پزشک.

چنانچه یک نوبت مصرف این دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری آن را میل نمایید در صورتی که نزدیک نوبت مصرف بعدی دارو بود دوز فراموش شده را حذف کنید و دوزهای بعدی را نیز دوبرابر نمایید.

عوارض جانبی:

با مصرف این دارو ممکن است همراه با اثرات درمانی عوارض ناخواسته‌ای بروز نماید اگرچه همیشه و یا همه عوارض گفته شده ممکن است در یک فرد ظاهر نشود. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر پزشک خود را در جریان قرار دهید.

• زردی چشم یا پوست، تیره شدن و یا وجود خون در مدفوع، درد ناحیه کمر، بثورات جلدی، خارش، ظاهر شدن لکه‌های سفید یا زخم بر روی لب و دهان، گلودرد، خستگی مفرط، سرگیجه و هیجان.

• عوارض خونی زیر نیز به ندرت مشاهده شده است:

نوتropینی و ترومبوستوینی / گزارش‌های بسیار نادر از کم خونی همولیتیک.

همچنین مواردی از افزایش خفیف آنزیمه‌های کبدی / آسیب به کلیه‌ها و بروز خونریزی غیر معمول و تهوع و استفراغ، مشاهده شده است.

مسومیت:

• مصرف دوزهای درمانی بالاتر از حد معمول در طولانی مدت می‌تواند ایجاد مسمومیت نماید.

• آسیب کبدی و با درصد وقوع کمتر آسیب کلیوی از عوارض مصرف بیش از مقدار توصیه شده تاینوفن[®] می‌باشند.

• علایم اولیه مسمومیت تهوع و استفراغ است که معمولاً در ۲۴ ساعت اول بروز می‌کند و پس از این زمان همراه با احساس درد و حساس شدن در ناحیه شکم می‌باشد.

• در صورت بروز علایم فوق و یا مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مرکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

• دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

• دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

Ref: BNF74, September 2017 - March 2018, Page 422-424

Drug Facts and Comparisons 2010, Vol1, Page 1222-1224

USP DI 2007, Vol1, page 15-21



www.aryapharm.com

info@aryapharm.com

تولید شده در شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص)

۴۴۹۸ ۱۰۸۱ - ۳ ایران - تهران